

栃木県から見つかったハムシ類

誌名	宇都宮大学農学部學術報告 = Bulletin of the College of Agriculture, Utsunomiya University
ISSN	05664691
著者名	稲泉,三丸
発行元	[宇都宮大学農学部]
巻/号	17巻3号
掲載ページ	p. 28-66
発行年月	2000年3月

農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat



栃木県から見つかったハムシ類

稲 泉 三 丸

Leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) found in Tochigi Prefecture, Japan

Mitsumaru INAIZUMI

Laboratory of Applied Entomology, Faculty of Agriculture, Utsunomiya University,
350 Mine-machi, Utsunomiya, Tochigi, 321-8505 Japan

Résumé

To clarify the present status of the natural environment in Tochigi Prefecture and obtain basic data for preservation of the environment, the leaf beetles distributed in this prefecture and their inhabitation status including habitat and host plants were studied. The investigation was based on specimens which collected in Tochigi Prefecture during the past 50 years, and the references reported by investigators within and outside this prefecture.

In Tochigi Prefecture, there are 310 leaf beetles, being 57% of the recorded species in Japan (554 species) and the highest among all the prefectures in the nation. Occurrence of so many leaf beetles in Tochigi Prefecture may be due to various natural environments such as mountains with a high altitude, plains, hills, long and short rivers, and marshes.

Based on the inhabitation status of leaf beetles, natural environment that should be most preserved in this prefecture at present includes coppices and marshes, ponds and bogs. Coppices have deteriorated due to expansion of areas designed for urbanization, dumping of wastes, and increased traffics, which have unfavorably affected the inhabitation of many insects. Reclamation of marshes, ponds and bogs for the development of facilities such as golf fields and large residential complexes has driven indigenous species living there to extinction or to the point of extinction.

In this study, the author also referred to leaf beetles found in Tochigi Prefecture that are important in preserving natural environments, those that are pests for agricultural or horticultural crops, those that eat weeds and are useful for weed control, and those that were once agricultural pests but returned from farming lands to the wild.

緒 言

ハムシ類は甲虫目に属する昆虫で、これまで世界各地から50,000種、日本から約554種が記載されている(平嶋, 1989)。成虫、幼虫とも各種の植物の葉、莖、根、また種によっては花や種子を食べて生活するため、多数の農園芸作物及び樹木の害虫を含んでいる。

栃木県のハムシ科の研究は古く、1885年まで遡らなければならない。G. Lewisは1880~1881年にかけて日本各地で昆虫採集を行っているが、その標本によって、

Jacoby (1885 a, 1885 b) は日光からニッコウルリハムシ、リンゴコフキハムシ、ルイスクビナガハムシなど23種を、また Gorham (1885) も野木町野渡からクロマダラカメノコハムシなど2種を記録している。しかも、それらの殆どは新種として記載されたものであった。

その後、加藤(贍)(1949)、大野(1964)、稲泉(1969)などによって種が追加され、1970年には110種を数えた(稲泉, 1970 a)。さらに、1970~1980年代半ばには加藤(仁)(1970, 栃木県北部のハムシ; 50種)や福田(1976 b, 1981, 1982)、稲泉(1986 c, 日光のハムシ; 149種他)に

より追加され220種に達した。1980年代末以降は佐藤(1989 a, 1989 b 他)によるネクイハムシ類の追加や八溝山地のハムシ(稲泉, 1990c; 148種), 足利市のハムシ(大川, 1990; 142種), 足尾山地のハムシ(稲泉, 1994; 112種), 鹿沼市上南摩のハムシ(滝沢, 1994; 173種), 宇都宮市の水辺のハムシ(稲泉・佐藤, 1996; 133種), 渡良瀬遊水池のハムシ(大川, 1997; 81種), 小山市出井のハムシ(滝沢・小池, 1998; 94種), 栗山地域のハムシ(滝沢・佐藤, 1998; 170種), 黒磯市のハムシ(佐藤・大川, 1998; 149種)などにより多くの種が追加され, 1999年現在300種を越えるまでに至った。おそらく, 近隣の種数や本州から見つかっている種数から考えて, 栃木県のハムシ相の解明率は95%以上に達したと推定される。これは, 初期においては大野正男博士の, 最近においては本県内で調査され, 多くの種を見出された他, 県内同好者をご指導下された滝沢春雄氏のお力添えに負うところが大きい。

しかし, これまでの栃木県のハムシ科に関する報告は, いずれも小地域単位のファウナに限られ, 県内全域を網羅した報告は見られなかった。そこで, 筆者は今回未熟ながら, これまで多くの研究者によって少しずつ積み上げられた成果の一つにとりまとめ, 栃木県のハムシ科の全貌を明らかにしようとした。

今や全国的に各種の開発, 人間活動の拡大によって, 自然破壊や環境汚染が進み, いくつかの種は既に滅び, さらに多くの動植物種が絶滅の危機に瀕している。このままでは生物の多様性は失われ, 生物の一員である人間の健康にも悪影響が及ぶことは必至であろう。従って, 今早急に行われなければならないのは多様な生物種と共に, それらの住む自然環境をできるだけ広く保全することである。そのためには, まず地域ごとにそこに住んでいる生物の種類と, 環境の現況を把握することが保全上の第一歩であろう。

そこで, 本報では種類が多く, 野外において最も多く姿の見られるハムシ科を材料として取り上げ, 栃木県内に生息する種類と生息環境の現況を明らかにしようとした。本報が栃木県内の自然環境を保全する上での基礎資料となることを願って止まない。

本文に先立ち, 種名の同定を賜ったほか, 懇切なるご教示をいただいた滝沢春雄氏, 大野正男氏, 小宮義璋氏に厚くお礼申し上げる。

また, 栃木県立博物館収蔵標本の利用を許可された樋口弘道氏, 園部力雄氏, 佐藤光一氏にも深謝する。さらに, 標本を使用させていただいた阿部瑞枝, 市川洋児, 石川紀代美, 石塚忠教, 岩井大輔, 鶴沢裕之, 江頭麗子, 江尻勝也, 大兼善三郎, 太田泰宏, 大桃定洋, 尾田啓一,

香川清彦, 加進丈二, 加藤 仁, 川上幸司, 川田如久, 菊地範泰, 北原恭子, 熊沢隆義, 小畑洋道, 小林隆人, 斉藤浩一, 斉藤達也, 斉藤伸考, 佐藤光一, 杉本俊一郎, 関口洋一, 園部力雄, 平良 孝, 高嶋義則, 高橋 滋, 高橋優彦, 田中清貴, 田中 正, 田中隆介, 千原圭司, 土屋友洋, 手塚裕子, 中 一晃, 中村 淳, 梨本淳子, 新見清夫, 新田秀二, 根本みどり, 樋口弘道, 廣永輝彦, 日向博美, 福田南海男, 松原由佳, 松本佳美, 宮 睦子, 宮本竜夫, 保田和宏, 山岸泰生, 吉川博子, 吉富博之, 渡辺 一の諸氏にもお礼申し上げる。

調査方法

本報をまとめるに当たって使用したハムシ類標本の大部分は, 1950より1999年までの約50年間にわたって筆者及び宇都宮大学農学部応用昆虫学教室の諸氏が栃木県内各地から採集し, 同所に保管しているものである。また, 一部は栃木県立博物館に収蔵されている標本も利用させていただいた。その他, 文献調査を行い, 県内外の研究者によって栃木県内から記録された種についても, 文献記録として引用した。

ハムシ類には微小な種が多いため, 野外調査は道路添いや林縁, 草地, 河原などを踏査しての見つけ採りを主体として, ビーチングやスウィーピングを併用して採集し, 乾燥針刺標本に作成の後, 同定作業を行った。

結果および考察

1) 栃木県のハムシ相の概要と分布の特徴

標本および文献から栃木県のハムシ科の種類をまとめてみると, 次の項にリストとして示したとおり310種(他に未同定種5)に上ることが分かった。これは日本産ハムシ科の約57%に当たっており, これまで報告のある他の県と比較してみると, 埼玉県264種(1998年現在), 神奈川県293種(1997年), 福井県251種(1998年), 岐阜県214種(1982年), 福岡県269種(1989年)であり, 栃木県は全国一多くの種類が見つかる県といってもよいであろう。これは, 栃木県に多くの種が生息しているに加えて, これまでの調査による解明率が高いことを物語っているといえよう。

栃木県のハムシ科の種類が多い理由としては, 県中央部と南部には平野が広がり, 東部には丘陵地があり, 北西部には白根山(2,578m)を最高峰とする山岳地帯が連なっていること, また, 西北部の山岳地帯を源流部とする那珂川, 鬼怒川, 思川, 渡良瀬川などの河川環境があること, さらに, 栗山村鬼怒沼(2,000m), 日光市戦場ヶ原(1,500m)に代表される高層湿原の他, 渡良瀬

遊水池や塩原町の大沼、喜連川町上河戸の湿地など平地から山地帯にかけて多数の池沼や湿原に恵まれていることなど、栃木県の自然環境は多様性に富んでいることが上げられよう。

生息環境別に代表的な種をあげてみると以下のとおりである。

(1) 山地ではクロナガハムシ、アシボソネクイハムシ、ミヤマヒラタハムシ、カンバムジハムシ、オオホソルリハムシなど。

(2) 低山地ではズグロキハムシ、カシワツツハムシ、ムネアカウスイロハムシ、アオバノコヒゲハムシ、サメハダツブノミハムシなど。

(3) 平地ではキオビクビボソハムシ、イモサルハムシ、ホタルハムシ、イヌノフグリトビハムシ、ヘリグロテントウノミハムシなど。

(4) 湿地・池沼ではキンイロネクイハムシ、クスジツツハムシ、ジュウシホシツツハムシ、オオルリハムシ、ジュンサイハムシなど。

(5) 河川敷・水辺ではヨツボシアカツツハムシ、ウスグロチビツツハムシ、タテスジキツツハムシ、スジカミナリハムシ、コヤツボシハムシなど。

また、栃木県は日本列島のほぼ中央付近に位置しているため、トゲアシクビボソハムシ、トビサルハムシ、ツバキコブハムシなどの暖地性種や、アオチビツツハムシ、アザミオオハムシ、フキササルハムシなどの寒地性種が分布していることも特徴の一つと言えよう。

2) 保全を必要とする環境

栃木県の自然環境は北、西部の山地帯は一部を除けばほぼ良好な状態が維持されている。しかし、県南部、東部、中央の平野部や丘陵地では160か所におよぶゴルフ場や大型住宅団地の造成などにより、年々森林面積は減少の一途を辿っている。ハムシ科昆虫から見て、栃木県において特に保全を必要とする環境としては、里山（平地林）と湿地・池沼が上げられよう。

里山は大昔から人間生活の営みと調和を保ちつつ、多くの生物を育み、多様な生態系を維持してきた。ところが、近年里山環境は雑木林の減少、ゴミの投棄、車の乗り入れなどにより急激に消滅、あるいは劣悪化しており、その結果、昆虫類の生息にも大きな影響を与えている。特に大都市周辺ではその傾向は顕著であり、宇都宮市のハムシ相を例に上げれば、1960年代まで平地林やその周辺に多く生息していたカタピロハムシ、アカガネサルハムシ、ドロノキハムシ、アカタデハムシ、カタピロトゲトゲ、セモンジンガサハムシなど十数種は現在姿を消し

たか、著しく減少している。

また、湿地・池沼は水と水生植物から成る特異な自然環境であり、そこには、それらに依存して生活する固有な種類が生息している。ところが、各種開発においては、それらの湿地は完全に埋め立てられ、そこにいた生物が全滅するケースが後を絶たない。ハムシ科昆虫の例では、全国的にも数か所しか生息しないクロガネネクイハムシの県内唯一つの那須町富岡の湿地は、1989年にゴルフ場の造成で消滅している。また、喜連川町上河戸の沼で発見され新種として記載されたアカガネネクイハムシは、隣接するゴルフ場からの排水により絶滅の危機にさらされている。さらに、多数の湿地性昆虫が生息し、稀に見る昆虫の宝庫として知られるようになった渡良瀬遊水池は、首都圏の平地に位置するため、各種開発の格好の場所として狙われ、存続が危ぶまれている。

3) 保全を必要とする重要種

今後、栃木県内の開発において、特に保全上の注意を必要とする重要なハムシ科の種類と生息環境を上げると次のとおりである。カッコ内にはこれまでの発見地名も示した。

(1) オビモンナガハムシ（今市市、鹿沼市、八溝山の雑木林周辺の草地など）、(2) キンイロネクイハムシ（市貝町、喜連川町、南那須町、今市市、宇都宮市の湿地）、(3) アシボソネクイハムシ（栗山村鬼怒沼の湿原）、(4) フトネクイハムシ（黒磯市、益子町、塩谷町、市貝町などの湿地）、(5) トミナガネクイハムシ（喜連川町の湿地）、(6) アカガネネクイハムシ（喜連川町の湿地）、オオミズクサハムシ（那須町、小川町、大田原市、塩原町、宇都宮市などの湿地）、(7) ヨツボシアカツツハムシ（塩谷町、河内町、宇都宮市の鬼怒川河川敷）、(8) キイロナガツツハムシ（馬頭町、栃木市、足利市の雑木林周辺）、(9) ウスグロチビツツハムシ（宇都宮市、塩谷町の鬼怒川河原）、(10) クスジツツハムシ（益子町、今市市、塩谷町、鹿沼市の湿地）、(11) オオサルハムシ（藤岡町、野木町の渡良瀬遊水池）、(12) ヤツボシハムシ（黒磯市、黒羽町、宇都宮市、鹿沼市、田沼町などの河川敷林、雑木林周辺）、(13) ジュンサイハムシ（小川町、喜連川町、藤岡町渡良瀬遊水池などの沼、湿地）、(14) アオバホソハムシ（那須町、栗山村、藤原町の広葉樹林周辺の草地）、(15) クロセスジハムシ（鹿沼市、今市市、茂木町などの広葉樹林周辺の草地）、(16) ムネアカウスイロハムシ（馬頭町、田沼町、足利市の雑木林周辺）、(17) トケジホソトビハムシ（那須町、葛生町、田沼町の雑木林周辺）、(18) ヤハズトビハムシ（日光市、塩谷町、藤岡町渡良瀬

遊水池の湿地や河川沿い草地), (19) タグチホソヒラタハムシ (那須町, 黒磯市, 塩谷町, 宇都宮市, 足利市などの湿地や雑木林周辺草地), (20) イカリヒメジンガサハムシ (日光市, 粟野町, 葛生町の雑木林周辺草地).

その他, 栃木県内からの記録が1例のみの希少種にはザウテルマメゾウムシ (足利市), クロアシヒメツツハムシ (鹿沼市), クロルリハムシ (塩谷町), クロバハラグリハムシ (藤岡町渡良瀬遊水池), トホシマルトビハムシ (塩谷町) など十数種がある。

4) 害虫および益虫となるハムシ類

ハムシ科の昆虫類は植食性であるため, 多くの農業および林業害虫を含んでいる。梶原ら (1986) は日本で農園芸作物の害虫となるハムシ類として24種を上げている。また, 日本応用動物昆虫学会編 (1987) では農林害虫となるハムシ類として83種を上げている。そのうち, 栃木県に生息するのは前者では22種, 後者では74種にのぼっている。

また, 栃木県で農業害虫となり, 薬剤による防除を要するハムシ類 (栃木県農務部, 1998) としては, イネクビボソハムシ (イネドロオイムシ: イネ), フタスジヒメハムシ (ダイズ), ウリハムシ (キュウリ, カボチャ, ユウガオ), キスジノミハムシ (ダイコン, ハクサイ, キャベツ, ブロッコリー), ジュウシホシクビナガハムシ (アスパラガス), ウリハムシモドキ (クローバー類), アズキゾウムシ (貯蔵中のアズキ) を上げている。

その他, 筆者が栃木県内で農園芸作物の害虫となることを認めた主なものに, ヤマイモハムシ (ヤマノイモ), カタクリハムシ (ユリの芽や葉), アヤメトビハムシ (アヤメ), ナスナガスネトビハムシ (ナス, ジャガイモ), クロウリハムシ (カボチャ), ルリマルノミハムシ (バラなどの花卉を食害), ツツジコブハムシ (ツツジ), ヘリグロテントウノミハムシ (キンモクセイ, ヒイラギ) などがある。

また, 過去において農業害虫であったが, 農業散布により農耕地から姿を消した種類にネギオオアラメハムシ (ネギ, ラッキョウなどの害虫), イネネクイハムシ (幼虫がイネの根を食害), ダイコンハムシ (アブラナ科蔬菜類の害虫) があり, いずれも現在は本来の生息場所で野生植物を食べて細々と生き残っている。

その他, 雑草類をひどく食害するため, 人間にとって有用なハムシ類にコガタルリハムシとブタクサハムシがある。コガタルリハムシは, 畑地周辺や道端, 牧草地に繁茂するやっかいな雑草であるギンギンやスイバなどを葉脈だけを残して食べ尽くし, これらの雑草の防除に役

立っている。

ブタクサハムシは大野 (1997) により埼玉県内から日本で初めて発見されたもので, 花粉症の原因植物となるブタクサやオオブタクサ, オナモミ (キク科) を食べ, その防除に威力を発揮している。本種は北米東部からメキシコに分布するが, 最近, 北米から輸入した家畜の干し草に紛れ込んで日本に侵入し, 北は栃木県中部, 南は兵庫県方面に分布を拡大しつつあるという。本種は栃木県では年約5世代, 1雌当たり産卵数最多700卵 (未発表) の大繁殖力を持つところから, ブタクサ類が日本から姿を消す日も近いと考えられる。

5) 見つかった種類のリスト

凡例

(1) 本リストの記載は和名, 学名, 県内分布の概況 (生態知見を含む), 採集データ, 文献記録の順とした。

(2) 採集データは未発表のデータを採集場所, 採集年月日, 採集匹数, 採集者名の順に配列した。

(3) 文献記録は筆者が既に発表した記録, 及び文献から引用した記録を, 採集場所 (著者名, 年号) の順に記した。

(4) 採集データと文献記録, 特に前者は膨大な数に上るため, それぞれ県内分布を代表する記録を, 1種につき最多5例まで挙げるに止めた。

(5) 和名, 学名及び全国分布の記述は木元・森本 (1984), 木元・滝沢 (1994), 平嶋 (1989, 監修), 野尻湖昆虫グループ (1985) によった。

ナガハムシ亜科 Orsodacninae

1. クロナガハムシ *Orsodacne arakii* Chūjō

県内では700~1500mの山地から亜高山にかけての花上などで時々見られる。

採集データ: 黒磯市三斗小屋, 2-VIII-1993, 1ex., 廣永. 栗山村湯西川, 17-VI-1981, 2exs., 稲泉. 日光市細尾峠, 12-V-1997, 1ex., 佐藤. 鹿沼市古峰ヶ原, 18-V-1997, 1ex., 佐藤他.

文献記録: 藤原町上三依 (稲泉, 1985a). 日光市光徳 (稲泉, 1986c). 那須岳 (加藤, 1970). 栗山村川俣 (滝沢・佐藤, 1998) 他.

モモトハムシ亜科 Zeugophorinae

2. ワモンナガハムシ *Zeugophora annulata* (Baly)

県内では平地~山地にかけて, コマユミやツルウメモドキ, マサキなどで見られ, 時に群生して葉にひどい食害を与える。

採集データ：那須町豊原甲，3-V-1994，11exs.，稲泉。塩原町ヨシ沼，7-VI-1995，2exs.，香川。日光市千手ヶ原，21-VI-1985，1ex.，新見。宇都宮市西原町，24-IV-1960，2exs.，稲泉。田沼町氷室山，27-V-1969，5exs.，稲泉他。

文献記録：黒磯市赤坂（佐藤・大川，1998）。矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990c）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。足利市石尊山（大川，1990）他。

3. ムナグロナガハムシ *Zeugophora bicolor* (Kraatz)
県内では山地帯でマユミから得られているが少ない。

採集データ：矢板市長井，29-V-1991，1ex.，稲泉。

文献記録：日光市戦場ヶ原（福田，1981）。粟野町横根山（稲泉ら，1988）。塩原町元湯（佐藤・大桃，1992）。

4. オビモンナガハムシ *Zeugophora unifasciata* (Jacoby)

本種は Jacoby (1885 a) が Nikko から得られた個体により新種として記載した種である。その後の県内からの記録は次の3例のみである。

採集データ：今市市小休戸，19-VII-1996，1ex.，稲泉。

文献記録：八溝山（市毛，1984）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。

5. アカイロナガハムシ *Zeugophora varipes* (Jacoby)

本種は Jacoby (1885 a) が Chiuzenji (Nikko) からの標本により新種として記載した種である。県内からの発見例は以下のとおりである。

採集データ：鹿沼市石裂山，28-V-1997，1ex.，稲泉。

文献記録：茂木町鎌倉山（稲泉，1990 c）。塩原町大沼（大桃・佐藤，1992；ツルマサキより）。西那須野町千本松（大桃・佐藤，1992・ニシキギより；佐藤・大桃，1995・イボタより）。

カタピロハムシ亜科 Megalopodinae

6. カタピロハムシ *Colobaspis japonica* (Baly)

早春，成虫は低山地のコバノトネリコ新梢を噛み切る習性があるため，分布状況を知る指標となる。都市周辺では開発のため，急激に姿が見られなくなった。

採集データ：西那須野町千本松，27-IV-1992，5exs.，大桃。宇都宮市水道山，14-IV-1963，13exs.，関口他。

文献記録：鹿沼市岩山（尾田，1951）。足利市松田川上流（大川，1990）。黒磯市板室（佐藤・大桃，1995）。栗山村湯西川（滝沢・佐藤，1998）他。

マメゾウムシ亜科 Bruchinae

7. シャープマメゾウムシ *Kytorhinus shapianus* Bridwell

マメ科のクララから得られているが，分布は局所的である。

採集データ：宇都宮市駒生湿地，11-VI-1994，3exs.，香川。

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤・大桃，1994）他。

8. エンドウゾウムシ *Bruchus pisorum* (Linnaeus)

本種以下の3種はマメ類（種子）の貯穀害虫で，野外で見つけることは少ないが，軒下や室内に放置されたマメ類に集まることもある。

採集データ：宇都宮市峰町，22-IV-1994，3exs.，阿部他。

文献記録：宇都宮市下砥上（佐藤・大桃，1994）。小山市出井（滝沢・小池，1998）他。

9. ソラマメゾウムシ *Bruchus rufimanus* Boheman

採集データ：宇都宮市峰町，21-X-1993，1ex.，香川。

文献記録：南河内町薬師寺（稲泉，1993）他。

10. アズキゾウムシ *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus)

採集データ：宇都宮市峰町，23-IX-1990，1ex.，中。足利市迫間，30-VII-1989，1ex.，保田他。

文献記録：宇都宮市長岡湿地（佐藤，1996）。藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

11. チャバラマメゾウムシ *Callosobruchus ademptus* (Sharp)

採集データ：益子町大平，21-IX-1997，4exs.，稲泉。岩舟町三轟山，20-IV-1998，1ex.，稲泉。

文献記録：塩谷町佐貫，茂木町千本（佐藤・大桃，1994）。栃木市柳原町（吉富，1994；冬季にケヤキ樹皮下より得た）他。

12. ヒゲナガマメゾウムシ *Bruchidius lautus* (Sharp)

県内からの発見例は少なく，次の2例（3匹）のみである。

文献記録：栗山村土呂部（佐藤・大桃，1992）。栗山村湯西川（稲泉，1993）。

13. サムライマメゾウムシ *Bruchidius japonicus* (Harold)

ヤマハギの種子につくとされるが，県内からの記録は少ない。

文献記録：栗山村土呂部，馬頭町大山田（佐藤・大桃，1994）。塩谷町佐貫（佐藤・大桃，1996；滝沢氏のご指示によれば，本報告のシロモンマメゾウムシは本種のシ

ノニム).

14. ネムノキマメゾウムシ *Bruchidius terrenus* (Sharp)

文献記録: 宇都宮市柳田町 (稲泉, 1993). 栃木市尻内 (吉富, 1994; 冬季にケヤキ樹皮下より得た) 他.

15. シリアカマメゾウムシ *Bruchidius urbanus* (Sharp)
ニセアカシアの種子を食べる。

文献記録: 塩谷町風見 (佐藤・大桃, 1994). 宇都宮市石井町 (稲泉, 1993). 栃木市柳原町 (吉富, 1994; 冬季にケヤキ樹皮下より得た) 他.

16. サイカチマメゾウムシ *Megabruchidius dorsalis* Borowiec

採集データ: 宇都宮市峰町, 7-VI-1994, 20exs., 香川.

文献記録: 宇都宮市鶴田町 (佐藤ら, 1992).

17. ザウテルマメゾウムシ *Sulcobruchus sauteri* (Pic)

カエデなどの花に集まるとされる稀種で, 県内からの記録は次の1例のみ。

文献記録: 足利市渡良瀬川 (大川, 1994).

18. イタチハギマメゾウムシ *Acanthoscelides pallidipennis* (Motschulsky)

文献記録: 藤岡町渡良瀬遊水池 (佐藤ら, 1999).

原産地は北米であるが, 10年ほど前からヨーロッパ, 地中海, アジアでは朝鮮北部に分布を拡大, 日本にも最近侵入したらしい (佐藤ら, 1999).

ネクイハムシ亜科 Donaciinae

19. ガガブタネクイハムシ *Donacia lenzi* Schönfeldt

県中央部~北部にかけての丘陵地の湿地に局所的に生息する。

文献記録: 大田原市羽田沼 (佐藤, 1991; ジュンサイより得た). 喜連川町上河戸 (佐藤ら, 1987; ジュンサイ, ヒツジグサより得た). 南那須町大金 (佐藤・大桃, 1997) 他.

20. イネネクイハムシ *Donacia provostii* Fairmaire

県中央部~南部のいくつかの湿地から記録されている。

文献記録: 矢板市石関 (佐藤ら, 1987; ヒツジグサ, ヒルムシロより得た). 小川町東戸田 (佐藤, 1989 a; ヒシより得た). 藤岡町渡良瀬遊水池 (佐藤・大桃, 1992; ハスより得た) 他.

21. クロガネネクイハムシ *Donacia flemola* Goecke

日本では長野県, 広島県, 阿武隈山地, 栃木県那須町の4地点から局所的に知られていたが, 本県唯一の生息地であった那須町の沼は, 1998年にゴルフ場建設のため埋め立てられ, 絶滅した。

文献記録: 那須町富岡吉ノ目 (佐藤, 1989a).

22. キンイロネクイハムシ *Donacia japana* Chūjō et Goecke (Plate の1)

県中央部~北部の丘陵地の湿地で見られるが, 少ない。採集データ: 喜連川町上河戸, 22-VII-1988, 7 exs., 稲泉他.

文献記録: 那須町富岡吉ノ目 (佐藤ら, 1987). 今市市木和田島・弁天沼 (佐藤・加藤, 1991). 宇都宮市鶴田沼 (佐藤, 1989 b) 他.

23. ヒラタネクイハムシ *Donacia hiurai* Kimoto

県中央部~北部の平地~山地の湿地に広く分布する。

採集データ: 塩原町大沼, 27-VI-1986, 47exs., 稲泉. 日光市田母沢, 6-VI-1986, 1ex., 稲泉. 市貝町多田羅沼, 8-V-1986, 3exs., 稲泉他.

文献記録: 大田原市若林沼 (佐藤ら, 1987). 藤原町枯木沼, 今市市手岡 (佐藤, 1989 a). 宇都宮市初網沼 (稲泉・佐藤, 1996). 足利市迫間湿地 (大川・草野, 1996) 他.

24. アンボソネクイハムシ *Donacia sparganii gracilipes* Jacoby

日本では長野県, 栃木県および東北地方の高い山や北海道の湿地に生息する。本県では標高2,000mの鬼怒沼からのみ知られている。

文献記録: 栗山村鬼怒沼湿原 (稲泉, 1986 a; 佐藤ら, 1987).

25. ツヤネクイハムシ *Donacia nitidior* (Nakane)

ヒラタネクイハムシ, キヌツヤミズクサハムシと共に県内の湿地や池沼に広く分布し, スゲ類に集まる。

採集データ: 黒羽町両郷, 4-VI-1994, 1ex., 稲泉. 喜連川町上河戸, 6-V-1988, 23exs., 稲泉. 市貝町多田羅沼, 8-V-1986, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 那須町豊原甲 (佐藤ら, 1987). 小川町東戸田, 南那須町鴻野山 (佐藤, 1989a). 足利市迫間湿地 (稲泉, 1986 a) 他.

26. フトネクイハムシ *Donacia clavareau* Jacobson

県内の生息地は6カ所ほどで, 発見された個体数も少ない。

文献記録: 黒磯市寺子 (木附, 1995). 塩谷町上沢 (佐藤ら, 1998). 益子町小泉本田八幡池 (佐藤, 1989 a; ウキヤガラより) 他.

27. トミナガネクイハムシ *Donacia bicoloricornis* Chen

県内の記録は次の1例のみ。日本では他に青森県, 茨城県, 千葉県から見つかった。

文献記録: 喜連川町上河戸 (佐藤ら, 1987).

28. アカガネクイハムシ *Donacia hirtihumeralis*
Komiya et Kubota

1987年に Komiya et Kubota により、喜連川町上河戸の沼でフトイから発見され、新種として記載された種である。その後、岩手県からも見つっている。

採集データ：喜連川町上河戸，30-V-1988，多数，稲泉他。

文献記録：同上（佐藤，1989a）。

29. オオミズクサハムシ *Plateumaris constricticollis*
Jacoby

県内では下記の他、宇都宮市以北の河内町、今市市、小川町、大田原市などの湿地で点々と記録されている（佐藤・1989 a, 1989 b）。

文献記録：黒羽町大塩溜（佐藤・加藤，1991）。藤原町鶏頂開拓（佐藤，1989 a）。塩原町和田山（稲泉，1996）。塩谷町田所（佐藤・大桃，1997）。鹿沼市深津（佐藤，1989 b）他。

30. シラハタネクイハムシ *Plateumaris shirahatai*
Kimoto

日本では北海道、岩手県、山形県に分布。県内では那須町に生息する湿地が多い。

文献記録：那須町高久丙（佐藤ら，1987）。鹿沼市古峰ヶ原（松原，1988）。

31. キヌツヤミズクサハムシ *Plateumaris sericea*
(Linnaeus)

県中央部～北部の平地から高山にかけて、湿地に広く分布する。

採集データ：栗山村鬼怒沼，19-VII-1970，2 exs.，稲泉。日光市戦場ヶ原，11-VI-1983，2 exs.，稲泉。宇都宮市古賀志・唐沢池，10-V-1986，4 exs.，稲泉他。

文献記録：黒磯市杉渡土（佐藤・大川，1998）。栗山村野門（滝沢・佐藤，1998）。塩谷町鳥羽新田（佐藤ら，1987）。栗野町井戸湿原（稲泉ら，1988）。二宮町水戸部（佐藤ら，1999）他。

クビボソハムシ亜科 *Criocerinae*

32. ジュウシホシクビナガハムシ *Crioceris quatuordecimpunctata* (Scopoli)

アスパラガスの害虫として知られる。県内では藤原町、塩原町に多い。

採集データ：塩原町片岡，17-V-1992，20 exs.，大桃。西方町真名子，27-VII-1998，3 exs.，稲泉他。

文献記録：藤原町上三依（草野，1986）。足利市松田川上流，同小俣荒倉沢（大川・内山，1983；アスパラガスの他、キジカクシから得た）。

33. ルイスクビナガハムシ *Liliocerus lewisi* (Jacoby)

Jacoby (1885 a) が日光から新種として記載した種

である。県内では早春、山地帯のユリ科植物に見られる。採集データ：藤原町枯木沼，11-VII-1995，1 ex.，稲泉。日光市光徳，5-VIII-1982，1 ex.，高橋（滋）。鹿沼市石裂山，28-V-1997，5 exs.，稲泉。葛生町柿平，29-IV-1998，1 ex.，稲泉他。

文献記録：黒羽町八溝山頂（稲泉，1990 c）。矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）。日光市田母沢（稲泉，1961）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）。足利市名草上町（大川，1990）他。

34. ホソクビナガハムシ *Liliocerus parvicollis* (Baly)

低山地のサルトリイバラで発見されるが、あまり多くない。

採集データ：黒磯市西俣沢，3-VIII-1994，1 ex.，稲泉。宇都宮市古賀志山，19-IV-1959，1 ex.，稲泉。

文献記録：日光市寂光の滝（福田，1981）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）他。

35. ケイロクビナガハムシ *Liliocerus rugata* (Baly)

自生するヤマノイモに多い。

採集データ：那須町大島，19-IX-1994，1 ex.，稲泉。塩原町新湯，20-VI-1959，稲泉。上河内町羽黒山，26-VI-1997，10 exs.，稲泉。烏山町横枕，18-V-1997，2 exs.，稲泉。田沼町長谷場，27-V-1998，2 exs.，稲泉他。

文献記録：黒磯市赤坂（佐藤・大川，1998）。栗山村上栗山（稲泉ら，1990）。馬頭町鷺子山，益子町雨巻山（稲泉，1990 c）。栃木市太平山（吉富，1996）他。

36. アカクビナガハムシ *Liliocerus subpolita*
(Motschulsky)

低山地～山地にかけてサルトリイバラ、タチシオデに見られる。

採集データ：那須町大和須，4-VI-1994，1 ex.，香川。塩原町古町，13-VI-1965，3 exs.，稲泉。喜連川町下河戸，3-V-1996，1 ex.，香川。宇都宮市古賀志山，16-VI-1962，1 ex.，福田（南）。田沼町飛駒，20-VI-1998，1 ex.，稲泉他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）。栗山村青柳（稲泉ら，1990）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。足利市石尊山登山口（大川・内山，1983）他。

37. ルリクビボソハムシ *Lema cirsicola* Chûjō

低山地～山地のアザミ類に多い。

採集データ：黒磯市木の俣沢，21-VI-1970，1 ex.，稲泉。栗山村湯西川，16-VI-1981，1 ex.，稲泉。塩谷町船生，14-VII-1998，1 ex.，稲泉。烏山町小木須，29-VII-

1997, 1ex., 稲泉. 葛生町前沢, 9-VIII-1998, 1ex., 岩井他.

文献記録: 那須町湯本 (大野, 1964). 栗山村日光沢 (稲泉・香川, 1992). 日光市戦場ヶ原 (稲泉, 1986c). 足尾町庚申山 (稲泉, 1994). 足利市大岩山 (大川, 1990).

38. トゲアシクビボソハムシ *Lema coronata* Baly
平地のツユクサで見られるが, 個体数は多くない。

採集データ: 黒羽町両郷, 4-VI-1994, 1ex., 稲泉. 茂木町下小貫, 1-VI-1997, 1ex., 小林. 栃木市星野町, 20-VI-1998, 1ex., 梨本他.

文献記録: 黒磯市寺子 (佐藤・大川, 1998). 真岡市下籠谷 (稲泉ら, 1997; 冬季に雑木林の落葉下から得た). 小山市出井 (滝沢・小池, 1998).

39. キバラリクビボソハムシ *Lema concinnipennis* Baly

県北部の2カ所から記録されている。

採集データ: 那須町豊原乙・常民夕狩, 2-VI-1994, 1ex., 佐藤. 西那須野町・草地試験場, 28-V-1991, 1ex., 大桃.

40. アカクビボソハムシ *Lema diversa* Baly
平地のツユクサに普通。

採集データ: 那須町大和須, 4-VI-1994, 1ex., 香川. 塩原町墓沼, 13-IX-1995, 1ex., 稲泉. 今市市小林, 12-VI-1996, 3exs., 稲泉. 鹿沼市上南摩, 1-VII-1992, 1ex., 稲泉. 西方町真名子, 27-VII-1998, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 黒羽町八溝山 (稲泉, 1990c). 矢板市尚仁沢 (稲泉, 1993; 稲泉・香川, 1993). 今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995). 宇都宮市柳田緑地 (稲泉・佐藤, 1996). 上三川町坂上 (稲泉ら, 1997; 冬季に雑木林の落葉下より得た) 他.

41. スゲクビボソハムシ *Lema dilecta* Baly
平地の水辺に生えるスゲ類で見られる。

採集データ: 黒羽町両郷, 4-VI-1994, 1ex., 稲泉. 宇都宮市峰町, 25-VIII-1969, 1ex., 稲泉. 岩舟町三轟山, 20-IV-1998, 2exs., 稲泉.

文献記録: 今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995). 茂木町牧野 (佐藤・大桃, 1994; イボクサより得た). 足利市迫間湿地 (大川, 1990) 他.

42. セアカクビボソハムシ *Lema scutellaris* (Kraatz)
県内では南部の平地から記録されている。

文献記録: 足利市迫間湿地 (大川, 1990). 藤岡町渡良瀬遊水池 (大川, 1997). 小山市出井 (滝沢・小池, 1998).

43. キオビクビボソハムシ *Lema delicatula* Baly
平地性でツユクサを食草とする。

採集データ: 塩谷町鳥羽ノ湯, 6-VII-1961, 1ex., 斉藤 (浩). 宇都宮市峰町, 1-VI-1985, 1ex., 高橋 (滋). 益子町大平, 21-IX-1997, 1ex., 稲泉. 足利市石尊山, 8-VIII-1998, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 黒磯市赤坂 (佐藤・大桃, 1995). 日光市小倉山 (稲泉, 1986c). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 足利市渡良瀬川 (大川, 1990) 他.

44. キベリクビボソハムシ *Lema adamsii* Baly
平地のヤマモに見られる。

採集データ: 上河内町羽黒山, 26-VI-1997, 4exs., 稲泉. 宇都宮市西原町, 12-V-1961, 1ex., 稲泉. 栃木市出流山, 6-V-1998, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 那須町寺子 (佐藤・大桃, 1992). 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990c). 宇都宮市徳次郎 (福田, 1972). 足利市名草大坂 (大川, 1990) 他.

45. ヤマイモハムシ *Lema honorata* Baly

平地～低山地のヤマノイモに多いが, 栽培種につくこともある。

採集データ: 那須町稲沢, 14-X-1994, 1ex., 稲泉. 塩原町墓沼, 13-IX-1995, 1ex., 稲泉. 日光市東小来川, 5-VIII-1983, 2exs., 稲泉. 市貝町笹原田, 30-VII-1997, 2exs., 香川. 佐野市唐沢山, 8-VI-1998, 3exs., 稲泉他.

文献記録: 黒磯市高林 (佐藤・大川, 1998). 栗山村上栗山 (稲泉ら, 1990). 今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995). 宇都宮市長岡湿地 (佐藤, 1996). 上三川町坂上 (稲泉ら, 1997; 冬季に雑木林の落葉下より得た) 他.

46. トホシクビボソハムシ *Lema decempunctata* Gebler

平地～低山地の人家周辺に見られるクコにつく。

採集データ: 藤原町中三依, 26-VIII-1978, 2exs., 田中 (正). 塩谷町佐貫, 25-VI-1968, 2exs., 大兼. 宇都宮市峰町, 30-IV-1997, 3exs., 稲泉. 田沼町栃本, 20-VI-1998, 1ex., 田中 (清) 他.

文献記録: 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990c). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 栃木市尻内, 同柳原町 (吉富, 1994; 冬季にケヤキ樹皮下より得た) 他.

47. イネクビボソハムシ *Oulema oryzae* (Kuwayama)
幼虫はイネドロオイムシといいイネの葉を食べる重要害虫であり, 県内の水田地帯に広く分布する。時に本種の本来の生息場所と思われる湿地や池沼でも見られる。

採集データ: 那須町大和須, 4-VI-1994, 1ex., 香川. 塩原町和田山, 7-VI-1995, 6exs., 稲泉. 今市市文挾,

23-VII-1991, 1ex., 稲泉. 茂木町木幡, 18-VI-1997, 1ex., 稲泉. 足利市石尊山登山口, 8-VIII-1998, 2 exs., 稲泉他.

文献記録: 黒磯市寺子(佐藤・大川, 1998). 今市市木和田島・弁天沼(稲泉ら, 1995). 宇都宮市西刑部町(稲泉ら, 1997; 冬季に雑木林の落葉下より得た). 小山市渡良瀬遊水池(大川, 1997).

48. アワクビソハムシ *Oulema dilutipes* (Fairmaire)
平地～低山地の草地に見られる。

採集データ: 塩谷町船生, 11-IX-1996, 1ex., 稲泉. 粟野町上粕尾, 6-IX-1987, 1ex., 熊沢. 西方町真名子, 27-VII-1998, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 藤原町横川(稲泉, 1991c). 馬頭町入郷(草野, 1988). 宇都宮市駒生湿地(稲泉・佐藤, 1996). 足利市名草(稲泉, 1989c) 他.

49. ハヤシクビソハムシ *Oulema hayashii* Ohno
県内では下記からのみ得られている。

文献記録: 那須町豊原乙・常民夕狩(佐藤ら, 1998).

ナガツツハムシ亜科 Clytrinae

50. ヨツボシナガツツハムシ *Clytra arida* Weise

山地帯のヤナギ類, ハギ類などから得られる。

採集データ: 栗山村湯西川, 30-VII-1965, 1ex., 稲泉. 栗山村ウスクボ平, 18-VII-1995, 1ex., 廣永他.

文献記録: 那須町湯本(大野, 1964). 塩原町元湯(稲泉ら, 1987). 黒磯市亀山(佐藤・大川, 1998)他.

51. ヨツボシアカツツハムシ *Coptocephala orientalis* Baly

県内では鬼怒川中流域の河原に沿って分布し, カワラヨモギに多い。

採集データ: 宇都宮市柳田・鬼怒川, 25-VII-1990, 多数, 稲泉.

文献記録: 塩谷町風見山田・鬼怒川, 河内町下岡本・鬼怒川(佐藤, 1991).

52. キボシルリハムシ *Smaragdina aurita* (Linnaeus)

平地から高山帯まで分布し, イタドリやハギ, ヤナギ類などに普通。高い山ほど個体数は多い。

採集データ: 藤原町鶏頂山, 11-VII-1995, 2 exs., 稲泉. 黒磯市三斗小屋, 28-VII-1986, 高橋(滋). 日光市白根山, 19-VII-1977, 2 exs., 稲泉. 真岡市下籠谷, 25-V-1984, 2 exs., 稲泉. 葛生町秋山, 21-VI-1998, 1ex., 小林他.

文献記録: 栗山村日光沢(稲泉・香川, 1992). 那須町小深堀(佐藤ら, 1994). 今市市木和田島・弁天沼(稲泉ら, 1995). 粟野町横根山(稲泉ら, 1988). 小山

市出井(滝沢・小池, 1998) 他.

53. ムナキルリハムシ *Smaragdina semiaurantiaca* (Fairmaire)

4～6月, 平地～低山地の道ばた, 林縁などに多い。

採集データ: 那須町豊原甲, 3-V-1994, 3 exs., 稲泉. 矢板市長井, 5-V-1993, 4 exs., 稲泉. 小川町片平, 14-V-1996, 1ex., 香川. 宇都宮市峰町, 11-V-1985, 1ex., 稲泉. 葛生町柿平, 29-IV-1998, 4 exs., 稲泉他.

文献記録: 黒羽町八溝山(稲泉, 1990c). 栗山村湯西川(滝沢・佐藤, 1998). 日光市西小来川(稲泉, 1986c). 宇都宮市睦町(園部, 1998). 藤岡町渡良瀬遊水池(稲泉・香川, 1991) 他.

54. キイロナガツツハムシ *Smaragdina nipponensis* (Chūjō)

県内記録は下記の他, 足利市から数例見られるが少ない。

採集データ: 栃木市出流町, 16-V-1998, 2 exs., 稲泉.

文献記録: 馬頭町鷺子山(稲泉, 1990c). 足利市田島(大川・内山, 1983) 他.

ツツハムシ亜科 Cryptocephalinae

55. ハギツツハムシ *Pachybrachys eruditus* (Baly)

平地～山地帯までハギ類で見られるが, 分布の中心は700m付近の山地帯である。

採集データ: 大田原市今泉, 15-VI-1997, 1ex., 佐藤. 栗山村八丁の湯, 28-VII-1964, 2 exs., 稲泉他.

文献記録: 那須町豊原乙(佐藤ら, 1989). 塩原町元湯(稲泉ら, 1987). 足尾町バラクラ沢(稲泉, 1994). 小山市出井(滝沢・小池, 1998) 他.

56. タマツツハムシ *Adiscus lewisii* (Baly)

平地～低山地の雑木林周辺で見られる。

採集データ: 黒磯市鹿野崎, 14-VII-1997, 3 exs., 佐藤. 田沼町飛駒, 20-VI-1998, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 黒磯市細竹(佐藤・大川, 1998). 高根沢町仁井田(稲泉, 1983a). 宇都宮市長岡湿地(佐藤, 1996). 足利市行道山～大岩山(大川, 1990) 他.

57. クロアシヒメツツハムシ *Coenobius piceipes* Gressitt

県内からの記録は次の一つだけである。

文献記録: 鹿沼市上南摩(滝沢, 1994).

58. ミスジツツハムシ *Cryptocephalus semenovi* Weise
県内からは次の記録がある。

文献記録: Nikko (Chūjō et Kimoto, 1961).

59. バラルリツツハムシ *Cryptocephalus approximatus* Baly

県内全域でバラやハギ, ヤナギ類などに最も普通に見

られる。

採集データ：那須町黒田原，14-V-1967，1ex.，稲泉。塩原町大沼，7-VI-1995，1ex.，稲泉。喜連川町石久保，19-V-1997，2exs.，稲泉。宇都宮市峰町，23-V-1961，1ex.，樋口。田沼町下彦間，20-VI-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：黒磯市沼ツ原（佐藤・大川，1998）。栗山村日陰（滝沢・佐藤，1998）。日光市男体山（稲泉，1986c）。益子町高館山（稲泉，1990c）。足利市織姫山（大川，1990）他。

60. ルリツツハムシ *Cryptocephalus aeneoblitus* Takizawa

平地～山地で前種に混じって得られるが，分布の中心は山地帯である。

採集データ：黒磯市三斗小屋，29-VII-1969，1ex.，稲泉。塩原町新湯，20-VI-1959，1ex.，稲泉。日光市戦場ヶ原，11-VI-1981，1ex.，高橋（滋）。宇都宮市鶴田沼，23-V-1962，1ex.，渡辺（一）他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）。栗山村日光沢（稲泉・香川，1992）。日光市裏見の滝（稲泉，1986c）。栗野町井戸湿原（稲泉，1994）他。

61. キアシルリツツハムシ *Cryptocephalus fortunatus* Baly

採集データ：黒磯市百村・大川林道，2-VIII-1994，1ex.，千原。栗山村湯西川，27-IX-1982，1ex.，稲泉。日光市太郎山，7-VIII-1996，1ex.，稲泉。喜連川町上河戸，30-V-1988，2exs.，稲泉。田沼町作原，21-VI-1998，1ex.，香川他。

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990c）。藤原町上三依（稲泉，1985a）。足尾町神子内（稲泉，1994）。足利市粟谷～彦谷（大川，1990）他。

62. ヤツボシツツハムシ *Cryptocephalus japanus* Baly

平地～低山地の雑木林周辺で見られるが，最近，平地ではあまり見かけなくなった。

採集データ：塩原町塩釜，30-V-1968，1ex.，田中（正）。今市市小林，12-VI-1996，1ex.，稲泉。宇都宮市石井町，10-VI-1960，1ex.，稲泉。真岡市下籠谷，13-V-1983，1ex.，稲泉他。

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）。栗山村土呂部（滝沢・佐藤，1998）。日光市小倉山（稲泉，1986c）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

63. コヤツボシハムシ *Cryptocephalus instabilis* Baly

平地～高い山の川沿いなどに自生するヤナギ類で見られる。

採集データ：黒磯市沼ツ原，23-VI-1979，1ex.，稲泉。

矢板市長井，29-V-1991，1ex.，稲泉。馬頭町小口・那珂川，14-V-1996，8exs.，稲泉。宇都宮市柳田緑地，10-V-1997，3exs.，稲泉。

文献記録：Jomin Yukari, Nasu, Kinugawa Riv., Shioya (Takizawa *et al.*, 1998)。藤原町上三依（稲泉，1985a）。日光市元湯（稲泉，1986c）。

64. ニセコヤツボシツツハムシ *Cryptocephalus luridipennis pallescens* Kraatz

1998年に滝沢らが本県的那須町他から日本で初めて記録した種である。県内産地は，今のところ那須町と塩谷町であるが，前種と形態が酷似するため，これまで前種とされたものの中に本種が含まれている可能性がある。

採集データ：那須町豊原乙・常民夕狩，15-VI-1997，3exs.，佐藤。

文献記録：Kofukabori, Nasu, Kinugawa Riv., Shioya (Takizawa *et al.*, 1998)。

65. キモトツツハムシ *Cryptocephalus kimotoi* Nakane

県内からの記録は次の2例のみである。

文献記録：黒磯市百村・大川林道（佐藤・大川，1998）。藤原町中三依（滝沢・佐藤，1998）。

66. ツマキクロツツハムシ *Cryptocephalus difformis* Jacoby

本種は Jacoby (1885a) が Nikko から得た3個体により新種として記載した種であるが，その後，県内からの記録はない。

67. クロボシツツハムシ *Cryptocephalus signaticeps* Baly

平地～山地にかけてイタドリやハギなどにごく普通に見られる。

採集データ：那須町豊原甲，3-V-1994，1ex.，香川。塩原町新湯，21-VI-1959，1ex.，稲泉。塩谷町鳥羽ノ湯，2-VI-1968，1ex.，田中（正）。栗野町上粕尾，21-VI-1998，1ex.，吉川。葛生町柿平，29-IV-1998，2exs.，稲泉他。

文献記録：大田原市野崎（加藤，1970）。栗山村白滝沢（滝沢・佐藤，1998）。日光市光徳（稲泉，1986c）。足尾町銀山平（稲泉，1994）。野木町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

68. ヨツモンクロツツハムシ *Cryptocephalus nobilis* Kraatz

平地～山地にかけて見られるが，個体数はあまり多くない。

採集データ：那須町茶臼岳～南月山，5-VII-1997，1ex.，佐藤。栗山村湯西川，30-VI-1981，1ex.，杉本。

日光市中禅寺, 6-VIII-1996, 1ex., 太田. 葛生町柿平, 29-IV-1998, 1ex., 香川他.

文献記録: 黒羽町八溝山 (稲泉, 1990c). 栗山村田代林道 (滝沢・佐藤, 1998). 宇都宮市古賀志山 (稲泉, 1969). 足利市名草 (大川, 1990) 他.

69. セスジツツハムシ *Cryptocephalus parvulus* Muller

分布の中心は1000m以上で, ヤシャブシヤイタドリなどの葉上に普通に見られるが, 夏冷涼な平地の湿地にも遺存的に生息している。

採集データ: 那須岳, 2-VIII-1993, 2exs., 阿部. 黒磯市三斗小屋, 1-VIII-1993, 1ex., 松本. 栗山村加仁湯, 3-VIII-1995, 1ex., 香川. 日光市志津, 5-VIII-1996, 2exs., 田中(隆). 茂木町下小貫, 1-VI-1997, 2exs., 小林他.

文献記録: 那須町伊王野 (稲泉, 1990c). 藤原町上三依 (稲泉, 1985a). 今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995). 宇都宮市鶴田沼 (佐藤ら, 1992). 足利市石尊山～深高山 (大川, 1990) 他.

70. チビルリツツハムシ *Cryptocephalus confusus* Suffrian

平地～山地に広く分布する。

採集データ: 栗山村湯西川, 6-VII-1982, 1ex., 稲泉. 日光市竜頭, 28-VII-1972, 1ex., 稲泉. 足尾町銀山平, 21-VI-1988, 1ex., 熊沢他.

文献記録: 黒磯市寺子 (佐藤・大川, 1998). 藤原町中三依 (滝沢・佐藤, 1998). 日光市戦場ヶ原 (稲泉, 1986c). 宇都宮市栗谷沢 (福田, 1981). 足利市大小山 (大川, 1990) 他.

71. アオチビツツハムシ *Cryptocephalus pumilo* Suffrian

県内からの記録は下記の3例のみで少ない。

文献記録: 黒磯市細竹 (佐藤・大桃, 1996). 黒磯市高林, 同細竹 (佐藤・大桃, 1997; オニグルミより得た).

72. キアシチビツツハムシ *Cryptocephalus amicus* Baly

県内分布は西部山地帯に限られ, 発見例も少ない。

採集データ: 栗山村八丁の湯, 29-VII-1963, 1ex., 稲泉. 日光市戦場ヶ原, 6-VIII-1996, 1ex., 根本. 鹿沼市古峰ヶ原, 12-VII-1970, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 那須町湯本 (大野, 1964). 栗山村奥鬼怒 (滝沢・佐藤, 1998).

73. モモグロチビツツハムシ *Cryptocephalus exiguus* Schneider

分布域は前種とほぼ同様で, 発見例も少ない。

採集データ: 那須町茶臼岳～南月山, 5-VII-1997, 1ex., 佐藤. 日光市湯元, 14-VII-1997, 1ex., 小林.

文献記録: 黒磯市三斗小屋 (稲泉, 1970c). 栗山村田代林道 (滝沢・佐藤, 1998). 日光市戦場ヶ原 (加藤, 1970). 鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉, 1991a; ニシキウツギより得た) 他.

74. ウスグロチビツツハムシ *Cryptocephalus fulvus* Goeze

県内分布は, ヨツボシアカツツハムシと同様, 鬼怒川中流域に限られ, 河原のカワラヨモギに多数みられる。

文献記録: 塩谷町風見山田・鬼怒川, 河内町下岡本・鬼怒川 (佐藤, 1991). 宇都宮市柳田町・鬼怒川 (稲泉, 1991a).

75. タテスジキツツハムシ *Cryptocephalus nigrofasciatus* Jacoby

Jacoby (1885a) が本県の Nowata から新種として記載した種である。河川沿いのヤナギ類に見られる。

採集データ: 大田原市今泉・蛇尾川, 15-VI-1997, 13exs., 佐藤. 今市市小休戸, 19-VII-1996, 8exs., 稲泉. 上三川町・鬼怒川, 11-VIII-1993, 1ex., 中村.

文献記録: 黒磯市湯宮 (佐藤・大川, 1998). 藤原町中三依, 塩谷町上沢・鬼怒川 (佐藤・大桃, 1992). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994) 他.

76. カシワツツハムシ *Cryptocephalus scitulus* Baly

低山地のクリ, コナラなどに多い。

採集データ: 栗山村湯西川, 29-VII-1981, 1ex., 田中(正). 塩谷町鳥羽ノ湯, 2-VII-1961, 1ex., 関口. 烏山町松倉山, 30-VII-1997, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 黒羽町八溝山 (稲泉, 1990c). 矢板市尚仁沢 (稲泉ら, 1993; 稲泉・香川, 1993). 宇都宮市宮原町 (稲泉, 1969). 足利市樺崎堤谷 (大川, 1990) 他.

77. ムツキボシツツハムシ *Cryptocephalus ohnoi* Kimoto (Plate 3)

県内からの記録は次の6例と思われる。

採集データ: 那須町常民夕狩, 29-VI-1999, 1ex., 稲泉. 葛生町秋山, 21-VI-1998, 1ex., 岩井.

文献記録: 塩原町大沼 (大桃, 1992). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 日光市山久保, 塩谷町上寺島 (佐藤ら, 1999).

78. キスジツツハムシ *Cryptocephalus limbatipennis* Jacoby

湿地性種で, 県内では次の4カ所から発見されている。

文献記録: 今市市木和田島・弁天沼 (佐藤・大桃, 1995). 塩谷町船生・天頂 (佐藤・大桃, 1996). 益子町大平 (稲泉, 1992). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994).

79. ジュウシホシツツハムシ *Cryptocephalus tetradecaspilotus* Baly

湿地に見られ個体数は少なくないが、分布する湿地は限られているようである。

採集データ：喜連川町上河戸，22-VII-1988，7exs.，稲泉。

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤・大桃，1992；ヌマトラノオより得た）。大田原市佐久山・平山溜（加藤，1969）。宇都宮市駒生湿地（稲泉・佐藤，1996）他。

コブハムシ亜科 Chlamisinae

80. ムシクソハムシ *Chlamisus spilotus* (Baly)

平地～低山地の雑木林で見られる。

採集データ：茂木町鮎田，1-VI-1997，1ex.，小林。岩舟町三叢山，20-IV-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：黒磯市鹿野崎（佐藤・大川，1998）。藤原町上三依（稲泉，1985 a）。宇都宮市東刑部（熊沢・渡辺，1992）。小山市出井（滝沢・小池，1998）他。

81. ツツジコブハムシ *Chlamisus laticollis* (Chūjō)

ツツジ類の害虫となる。

採集データ：那須町大和須，4-VI-1994，1ex.，稲泉。上河内町羽黒山，26-VII-1997，2exs.，香川。鹿沼市岩山，15-V-1970，1ex.，稲泉。足利市石尊山，8-VIII-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：黒磯市寺子（佐藤・大川，1998）。栗山村日陰（滝沢・佐藤，1998）。日光市田母沢（稲泉，1986c）。宇都宮市睦町（園部，1997）他。

82. ツバキコブハムシ *Chlamisus lewisii* (Baly)

県内記録は、ツバキの自生地として知られる高館山からの1例のみである。

文献記録：益子町高館山（渡辺・熊沢，1993）。

83. ハバビロコブハムシ *Chlamisus japonicus* (Jacoby)

これまでの県内記録は次の4地点である。

採集データ：矢板市長井，1-VI-1988，1ex.，稲泉。

文献記録：栗山村湯西川（稲泉，1983 b）。足利市名草上町，同松田川上流（大川，1990）他。

84. ミズキコブハムシ *Chlamisus interjectus* (Baly)

県内記録は足利市の2例のみ。

文献記録：足利市織姫山～行道山，同浅間山（大川，1990；ヒメコブハムシとして報告）。

85. カシワコブハムシ *Chlamisus consimilis* (Chūjō)

県内記録は、下記の他あまりないと思われる。

採集データ：那須町豊原乙・常民夕狩，15-VI-1997，2exs.，佐藤。

文献記録：藤原町横川（佐藤・大桃，1992）。宇都宮市峰町（稲泉，1983b）。足利市小俣岩切（大川，1990）。小山市出井（滝沢・小池，1998）他。

ツヤハムシ亜科 Lamprosomatinae

86. ドウガネツヤハムシ *Oomorphoides cupreatus* (Baly)

タラノキにごく普通。越冬成虫は5月中旬産卵，卵は6月中旬孵化，幼虫は土中に入りタラノキの根を食べて翌年の6月にサナギとなり，7月下旬に成虫となる（未発表）。

採集データ：黒磯市塩那スカイライン，1-VIII-1994，2exs.，山岸。栗山村湯西川，8-VII-1982，5exs.，稲泉。日光市小倉山，13-IX-1983，3exs.，稲泉。芳賀町給部，22-VII-1993，3exs.，稲泉。田沼町熊鷹山，8-VIII-1998，3exs.，香川他。

文献記録：那須町湯本（大野，1964）。塩原町大沼，同塩の湯，同元湯（稲泉ら，1987；銅黒型43，青藍色3）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。南那須町鴻野山（稲泉，1991 b）。足利市名草，同猪子（稲泉，1989 c；銅黒型17，青藍色型1）他。

87. アオグロツヤハムシ *Oomorphoides nigrocaeruleus* (Baly)

山地帯で見られるが、個体数は多くないようである。

採集データ：黒磯市三斗小屋，2-VIII-1993，2exs.，斉藤（達）。塩原町新湯，20-VI-1959，1ex.，稲泉他。

文献記録：那須岳大峠（加藤，1970）。栗山村湯西川（滝沢・佐藤，1998）。日光市霧降（稲泉，1986 c）他。

88. ヒメツヤハムシ *Oomorphus japanus* Jacoby

低山地～山地帯に分布。ラショウモンカズラ（鷺子山）やヨモギ（日光市）などから得た。日光沢では6月中旬に種々の草葉上に多数見られた。

採集データ：黒磯市沼ッ原，31-VII-1972，1ex.，稲泉。栗山村日光沢，2-VIII-1995，2exs.，稲泉他。

文献記録：黒磯市百村・大川林道（佐藤・大川，1998）。藤原町中三依（稲泉，1991 c）。日光市裏見の滝（稲泉，1984 a）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）他。

サルハムシ亜科 Eumolpinae

89. ヒトミヒメサルハムシ *Cleoporus variabilis* (Baly)

これまで報告された県内記録は次のとおり。

文献記録：日光市湯元（稲泉，1982 a）。宇都宮市徳次郎（福田，1976 b；ヒメリングより得た）。藤岡町渡良瀬遊水池（佐藤・大桃，1992；大川，1997）。都賀町家中・思川（佐藤ら，1998）。

90. チャイロサルハムシ *Basilepta balyi* (Harold)

600~700m以上のヤマハンノキやヤシブシに多い。

採集データ：黒磯市深山ダム, 1-VIII-1994, 1ex., 斉藤 (伸). 栗山村女夫淵, 2-VIII-1995, 1ex., 宮. 日光市男体山, 5-VIII-1982, 2 exs., 稲泉. 葛生町秋山, 21-VI-1998, 3 exs., 岩井他.

文献記録：黒羽町八溝山(稲泉, 1990 c). 矢板市尚仁沢 (稲泉ら, 1993 ; 稲泉・香川, 1993). 鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉ら, 1988) 他.

91. ウスイロサルハムシ *Basilepta pallidula* (Baly)

これまで報告された産地は以下の5地域である。宇都宮の生息地では個体数が多い。

採集データ：藤岡町渡良瀬遊水池, 5-VII-1991, 1ex., 香川.

文献記録：那須町高久・小深堀 (佐藤ら, 1994). 黒磯市細竹 (佐藤・大川, 1998). 宇都宮市駒生湿地 (佐藤・大桃, 1994). 足利市名草 (稲泉, 1989 c) 他.

92. アオバナサルハムシ *Basilepta fulvipes* (Motschulsky)

ヨモギにつく普通種。平地に多いが、時に山地でも見られる。

採集データ：塩原町新湯, 16-VII-1960, 1ex., 稲泉. 塩谷町佐貫, 29-VI-1996, 4 exs., 稲泉. 宇都宮市江曾島, 6-VII-1985, 13exs., 高橋 (滋). 田沼町飛駒, 20-VI-1998, 1ex., 江頭他.

文献記録：那須町湯本 (大野, 1964). 栗山村土呂部 (稲泉ら, 1990). 馬頭町鷺子山, 益子町雨巻山 (稲泉, 1990 c). 小山市渡良瀬遊水池 (大川, 1997) 他.

93. ムネアカサルハムシ *Basilepta ruficollis* (Jacoby)

本種は, Jacoby (1885 a) が Nikko 他より得られた標本により新種として記載した種である。山地帯で見られる。

採集データ：今市市小休戸, 19-VII-1996, 2 exs., 稲泉. 鹿沼市石裂山, 16-VII-1961, 2 exs., 斉藤 (浩). 田沼町作原, 20-VI-1998, 1ex., 小畑他.

文献記録：黒磯市萩平 (佐藤・大川, 1998). 矢板市尚仁沢 (稲泉ら, 1993 ; 稲泉・香川, 1993). 日光市小倉山 (稲泉, 1986 c). 足尾町庚申山 (稲泉, 1994). 足利市名草 (稲泉, 1989 c) 他.

94. ヒメキバナサルハムシ *Pagria signata* (Motschulsky)

平地~低山地にかけてクズやハギ類に多い。

採集データ：黒羽町両郷, 4-VI-1994, 1ex., 稲泉. 今市市小林, 12-VI-1996, 2 exs., 稲泉. 益子町西明寺, 1-VI-1958, 2 exs., 稲泉. 西方町真名子, 27-VII-1998,

1ex., 稲泉他.

文献記録：黒磯市寺子 (佐藤・大川, 1998). 大田原市佐久山 (加藤, 1970). 鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉, 1988). 足利市大岩山 (大川, 1990) 他.

95. イモサルハムシ *Colasposoma dauricum* (Mannerheim)

平地のヒルガオに多い。

採集データ：喜連川町上河戸, 22-VII-1988, 4exs., 稲泉. 宇都宮市峰町, 21-VI-1961, 3 exs., 樋口. 田沼町下彦間, 20-VI-1998, 4 exs., 稲泉他.

文献記録：黒磯市百村・木ノ俣 (佐藤・大川, 1998). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 足利市渡良瀬川 (大川, 1990) 他.

96. ドウガネサルハムシ *Scelodonta lewisii* Baly

平地のヤブガラシに多く見られる。

採集データ：栗山村湯西川, 24-VI-1980, 1ex., 稲泉. 塩谷町船生, 11-IX-1996, 1ex., 稲泉. 烏山町横枕, 18-V-1997, 2 exs., 稲泉. 栃木市太平山, 19-IX-1998, 3 exs., 稲泉他.

文献記録：黒磯市杉渡土 (佐藤・大川, 1998). 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990 c). 宇都宮市七久保溜 (稲泉・佐藤, 1996). 野木町渡良瀬遊水池 (大川, 1997) 他.

97. トビサルハムシ *Trichochrysea japana* (Motschulsky)

低山地の雑木林周辺で見られる。

採集データ：那須町黒田原, 14-V-1967, 1ex., 稲泉. 矢板市幸岡, 27-V-1962, 1ex., 関口. 小川町片平, 14-V-1996, 1ex., 稲泉. 市貝町笹原田, 24-IV-1997, 2 exs., 稲泉. 佐野市唐沢山, 8-VI-1998, 1ex., 稲泉他.

文献記録：黒磯市亀山 (佐藤・大川, 1998). 矢板市尚仁沢 (稲泉ら, 1993 ; 稲泉・香川, 1993). 日光市田母沢 (稲泉, 1986 c). 鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉, 1994). 栃木市太平山 (吉富, 1996) 他.

98. クロオビカサハラハムシ *Hyperaxis fasciata* (Baly)

低山地から記録されている。

採集データ：藤原町竜王峽, 24-V-1964, 1ex., 稲泉. 小川町片平, 14-V-1996, 2 exs., 稲泉. 大平町太平山, 19-IX-1998, 4 exs., 香川他.

文献記録：宇都宮市横山町 (福田, 1981). 宇都宮市鶴田沼 (佐藤ら, 1992). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994) 他.

99. マダラアラゲサルハムシ *Demotina fasciculata* Baly

低山地に多く、カン類やモミジイチゴなどで見られる。

採集データ：塩原町和田山, 18-V-1995, 1ex., 稲泉. 塩谷町船生, 11-IX-1996, 1ex., 稲泉. 宇都宮市古賀志

山, 3-V-1960, 1ex., 稲泉. 田沼町黒沢, 21-VI-1998, 4exs., 稲泉他.

文献記録: 矢板市尚仁沢 (稲泉ら, 1993; 稲泉・香川, 1993). 日光市西小来川 (稲泉, 1986c). 益子町雨巻山 (稲泉, 1990c). 足利市樺崎堤谷 (大川, 1990) 他.

100. コブアラゲサルハムシ *Demotina tuberosa* Chen
これまでの県内からの記録は次の2例のみである。

文献記録: 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 足利市松田川上流 (大川, 1990).

101. チビカサハラハムシ *Demotina decorata* Baly
県内からの記録は次の2例のみと思われる。

文献記録: 那須町高久丙・小深堀 (佐藤ら, 1994). 足利市大岩多門道 (大川, 1990).

102. カサハラハムシ *Demotina modesta* Baly
県内の生息地は平地から低山地。

採集データ: 黒磯市鹿野崎, 14-VII-1997, 16exs., 佐藤. 塩谷町佐貫, 22-VI-1958, 1ex., 稲泉. 烏山町下境, 29-VII-1997, 1ex., 鶴沢. 西方町真名子, 27-VII-1998, 5exs., 稲泉他.

文献記録: 黒磯市高林 (佐藤・大川, 1998). 矢板市尚仁沢 (稲泉ら, 1993; 稲泉・香川, 1993). 日光市霧降 (倉茂ら, 1965; アセチレン灯火に飛来). 宇都宮市長岡湿地 (佐藤, 1996). 足利市迫間湿地 (大川, 1990) 他.

103. ヒメアラゲサルハムシ *Dimotina vernalis* Isono
県内記録は次の2例。

文献記録: 藤原町横川 (滝沢・佐藤, 1998). 小山市出井 (滝沢・小池, 1998).

104. フキササルハムシ *Bromius obscurus* (Linnaeus)
県内では奥日光からのみ記録がある。

採集データ: 日光市小田代ヶ原, 18-IX-1982, 3exs., 高橋 (滋).

文献記録: 日光市戦場ヶ原 (福田, 1976a; オオマツヨイグサより得た). 日光市男体山 (稲泉, 1986c; ヤナギランより得た).

105. キカサハラハムシ *Xanthonia placida* Baly
これまでの県内記録は次の4地点と思われる。

採集データ: 田沼町下彦間, 20-VI-1998, 4exs., 稲泉.
文献記録: 藤原町中三依 (滝沢・佐藤, 1998). 鹿沼市上南摩 (佐藤・大桃, 1992). 小山市渡良瀬遊水池 (佐藤・大桃, 1992) 他.

106. アカガネサルハムシ *Acrothinium gaschkevitchii* (Motschulsky)

平地～山地にかけてミズキやエビズルなどに見られるが, 最近, 平地ではめっきり少なくなった。

採集データ: 黒磯市板室温泉, 3-VIII-1994, 1ex., 高橋 (滋). 塩原町新湯, 3-VI-1956, 1ex., 田中 (正). 日光市寂光の滝, 15-VI-1984, 1ex., 稲泉. 宇都宮市東峰町, 24-VI-1963, 1ex., 稲泉. 栃木市出流町, 16-V-1998, 2exs., 稲泉他.

文献記録: 那須町湯本 (大野, 1964). 藤原町上三依 (稲泉, 1985a). 今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995). 茂木町鎌倉山 (稲泉, 1990c). 小山市出井 (滝沢・小池, 1998) 他.

107. リンゴコフキハムシ *Lypesthes ater* (Baly)
平地～低山地のクリヤクルミ類で見られる。

採集データ: 塩原町大沼, 5-VI-1993, 3exs., 稲泉. 今市市小休戸, 19-VII-1996, 1ex., 稲泉. 宇都宮市峰町, 18-V-1961, 1ex., 樋口. 葛生町柿平, 29-IV-1998, 1ex., 香川他.

文献記録: 藤原町横川 (滝沢・佐藤, 1998). 矢板市尚仁沢 (稲泉ら, 1993; 稲泉・香川, 1993). 日光市田母沢 (稲泉, 1986c). 足尾町唐風呂川 (稲泉, 1994). 野木町渡良瀬遊水池 (大川, 1997) 他.

108. ニホンケブカサルハムシ *Lypesthes japonicus* Ohno

県内では南部の4地点から記録がある。

文献記録: 西方町城山 (稲泉, 1985b). 足利市樺崎 (大川, 1990). 栃木市太平山 (吉富, 1996). 藤岡町渡良瀬遊水池 (大川, 1997).

109. オオサルハムシ *Chrysochus chinensis* Baly
県内では渡良瀬遊水池からのみ発見されている。

文献記録: 藤岡町渡良瀬遊水池 (佐藤・大桃, 1992; 1994). 野木町渡良瀬遊水池 (大川, 1997).

ホソハムシ亜科 Synetinae

110. カバノキハムシ *Syneta adamsi* Baly

1000m前後に多く見られるが, 宇都宮市や足利市付近の低山地からも記録されている。

採集データ: 那須岳三本槍, 2-VIII-1993, 1ex., 中村. 塩原町大沼, 5-VI-1993, 8exs., 稲泉. 日光市西の湖, 11-VII-1984, 1ex., 稲泉. 宇都宮市古賀志山, 29-IV-1970, 1ex., 稲泉. 田沼町氷室山, 27-V-1969, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 黒磯市沼ッ原 (佐藤・大川, 1998). 栗山村鬼怒沼 (稲泉・香川, 1992). 馬頭町鷺子山, 益子町雨巻山 (稲泉, 1990c). 足利市石尊山 (大川, 1990) 他.

ハムシ亜科 Chrysomelinae

111. ヤナギリハムシ *Plagioderma versicolora* (Laicharting)

平地～山地のヤナギ類に普通。

採集データ：那須町豊原甲, 3-V-1994, 1ex., 香川。

栗山村湯西川, 6-VII-1982, 1ex., 川上。馬頭町小口, 14-V-1996, 3exs., 香川。栗野町上粕尾, 21-VI-1998, 2exs., 吉川。田沼町熊鷹山, 8-VIII-1998, 3exs., 小畑他。

文献記録：黒磯市百村・矢沢（佐藤・大川, 1998）。塩原町元湯（稲泉ら, 1987）。大田原市福原（加藤, 1970）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉ら, 1988）。足利市渡良瀬川（大川, 1990）他。

112. ダイコンハムシ *Phaedon brassicae* Baly

アブラナ科蔬菜の害虫として知られているが、県内では現在、本来の生息域と思われる湿地や河川沿いで、タネツケバナなどの野生種を食草として生活していると推察される。

採集データ：那須町稲沢, 8-V-1994, 2exs., 香川。

小川町片平, 14-V-1996, 1ex., 稲泉。河内町下ヶ橋・鬼怒川, 15-IX-1997, 1ex., 佐藤。

文献記録：黒磯市赤坂（佐藤・大川, 1998）。日光市中禅寺（稲泉, 1982c）。鹿沼市上南摩（滝沢, 1994）他。

113. コガタリハムシ *Gastrophysa atrocyanea* Motschulsky

平地のギシギシにもっとも普通に見られる種であるが、標高の高い日光市湯元（1600m）などでもアスファルト道路沿いのギシギシに多数見られることがある。これは食草と共に平地から人為的に運ばれてきたものであろう。

採集データ：那須町黒田原, 14-V-1967, 1ex., 稲泉。

栗山村日光沢, 3-VIII-1995, 1ex., 高嶋。日光市戦場ヶ原, 7-VI-1986, 6exs., 稲泉。宇都宮市峰町, 17-III-1999, 1ex., 稲泉。国分寺町小金井, 24-V-1961, 1ex., 樋口他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤, 1998）。矢板市尚仁沢（稲泉ら, 1993；稲泉・香川, 1993）。馬頭町鷺子山（稲泉, 1990c）。足尾町餅ヶ瀬（稲泉, 1994）。藤岡町渡良瀬遊水池（稲泉・香川, 1991）他。

114. ニッコウリハムシ *Chrysolina nikkoensis* (Jacoby)

Jacoby (1885 a) が Nikko 他から新種として記載した種である。その後、永い間本県からの記録はなかったが、最近下記により再発見された。

文献記録：那須町常民夕狩（佐藤ら, 1999）。

115. クロルリハムシ *Chrysolina yezoensis* (Matsumura)

県内記録は下記の1例のみと思われる。

文献記録：塩谷町鳥羽ノ湯（稲泉, 1982c）。

116. ヨモギハムシ *Chrysolina aurichalcea* (Mannerheim)

平地から高い山にかけてヨモギ上に見られる。

採集データ：黒磯市三斗小屋, 29-VII-1969, 2exs., 稲泉。矢板市長井, 6-VI-1990, 1ex., 稲泉。日光市湯元, 3-IX-1968, 10exs., 大兼。鹿沼市上南摩, 1-VII-1992, 1ex., 稲泉。小山市迫間田, 27-X-1984, 52exs. (うち4匹が銅金型), 稲泉他。

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉, 1990c）。藤原町上三依（稲泉, 1985a；青型239, 銅金型21）。奥日光（稲泉, 1986c；青型114, 銅金型124）。真岡市下籠谷（稲泉, 1990b；2匹の飛翔個体を目撃）。足利市山下町（大川, 1990）他。

117. ハッカハムシ *Chrysolina exanthematica* (Wiedemann)

平地～低山地に広く分布するが、個体数は必ずしも多くない。

採集データ：栗山村湯西川, 13-VI-1981, 1ex., 田中（正）。塩谷町佐貫, 29-VI-1996, 1ex., 稲泉。宇都宮市峰町, 22-IX-1982, 1ex., 稲泉。栃木市星野町, 20-VI-1998, 1ex., 梨本他。

文献記録：鹿沼市上南摩（滝沢, 1994）。藤岡町渡良瀬遊水池（福田, 1988）他。

118. オオルリハムシ *Chrysolina virgata* (Motschulsky) (Plate の2)

シロネを食べる湿地の固有種。県北には生息する湿地が多いが、今後の開発による湿地の消滅が懸念される。

採集データ：喜連川町上河戸・河戸新田, 20-VI-1988, 9exs., 稲泉。大田原市藤沢・琵琶池, 11-VIII-1970, 4exs., 加藤他。

文献記録：黒磯市三斗小屋（森島, 1980）。那須町高久丙・小深堀（佐藤・大桃, 1992）。矢板市東泉（加藤, 1971）。塩谷町鳥羽ノ湯（塩谷, 1982）。宇都宮市飯田町（佐藤, 1991）。藤岡町渡良瀬遊水池（福田, 1988；稲泉・香川, 1991）他。

119. ルリハムシ *Linnaeidea aenea* (Linnaeus)

標高500m以上のハンノキ類などに多い。

採集データ：黒磯市深山ダム, 1-VIII-1994, 1ex., 市川。塩原町新湯, 3-VI-1956, 2exs., 田中（正）。今市市小休戸, 19-VII-1996, 2exs., 香川。益子町高館山, 31-V-1959, 1ex., 稲泉。田沼町熊鷹山, 8-VIII-1998,

8 exs., 手塚他。

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990 c）。栗山村日光沢（滝沢・佐藤，1998）。日光市竜頭の滝（稲泉，1986 c）。足尾町餅ヶ瀬（稲泉，1994）。足利市名草（稲泉，1989 c）他。

120. ドロノキハムシ *Chrysomela populi* Linnaeus
平地～山地帯にかけてヤマナラシやヤナギ類に見られるが，最近，平地ではほとんど見かけないようである。

採集データ：大田原市今泉・蛇尾川，15-VI-1997，2 exs.，佐藤。日光市千手ヶ原，25-VII-1963，1 ex.，渡辺（一）。益子町高館山，31-V-1959，1 ex.，稲泉他。

文献記録：那須岳清水平（稲泉，1990 a）。塩原町大沼（稲泉ら，1987）。宇都宮市駒生湿地（稲泉・佐藤，1996）。足利市樺崎（大川，1990）他。

121. ヤナギハムシ *Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli)

平地～山地の湿地や河川敷のヤナギ類に見られる。

採集データ：日光市田母沢，7-VI-1985，2 exs.，高橋（滋）。足尾町細尾峠，12-V-1997，2 exs.，佐藤。茂木町鮎田，1-VI-1997，4 exs.，小林他。

文献記録：黒磯市阿久土（佐藤・大川，1998）。藤原町上三依（稲泉，1991 c）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）。小山市出井（滝沢・小池，1998）他。

122. クルミハムシ *Gastrolina depressa* Baly

平地～低山地のクルミ類に見られる。

採集データ：那須町大和須，4-VI-1994，2 exs.，稲泉。塩原町宇都野，9-VI-1970，1 ex.，稲泉。日光市小倉山，21-V-1972，1 ex.，稲泉。宇都宮市峰町，3-XII-1955，4 exs.，田中（正）。田沼町作原，21-V-1998，1 ex.，田中（清）他。

文献記録：黒磯市東原（佐藤・大川，1998）。栗山村日光沢（稲泉・香川，1992）。粟野町上粕尾（稲泉，1994）。栃木市大皆川（吉富，1994；冬季にケヤキ樹皮下より得た）他。

123. ミヤマヒラタハムシ *Gastrolina peltoidea* (Gebler)

県内では1000m付近のハンノキ類に多い。

採集データ：黒磯市木の俣沢，21-VI-1970，1 ex.，稲泉。栗山村湯西川，1-VII-1981，1 ex.，稲泉。矢板市八方ヶ原，7-VI-1970，1 ex.，田中（正）。日光市湯元，9-VII-1970，9 exs.，稲泉他。

文献記録：黒羽町上南方（稲泉，1990 c）。矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）。日光市寂光の滝（稲泉，1986c）。粟野町井戸湿原（稲泉，1994）他。

124. ズグロキハムシ *Gastrolinoides japonicus* (Harold)

低山地のイヌシデに見られる。

採集データ：那須町黒田原，14-V-1967，1 ex.，稲泉。塩原町和田山，18-V-1995，2 exs.，香川。今市市大笹林道，5-V-1962，1 ex.，関口。益子町西明寺，1-VI-1958，1 ex.，稲泉。田沼町飛駒，20-VI-1998，1 ex.，稲泉他。

文献記録：黒磯市戸田（佐藤・大川，1998）。栗山村日光沢（稲泉・香川，1992）。日光市東小来川（稲泉，1986 c）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）。足利市松田川上流（大川，1990）他。

125. フジハムシ *Gonioctena rubripennis* Baly

平地から低山地にかけてフジやハギ類に最も普通な種。最高所の記録としては日光市中宮祠（1,200m；稲泉，1986 c）がある。

採集データ：大田原市羽田，8-V-1995，1 ex.，香川。塩原町大沼，5-VI-1993，1 ex.，稲泉。今市市千本木，1-VII-1992，1 ex.，稲泉。宇都宮市峰町，7-VI-1986，1 ex.，高橋（滋）（ヤブサンザシより得た）。田沼町白岩，27-V-1998，2 exs.，稲泉他。

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）。栗山村土呂部（滝沢・佐藤，1998）。日光市霧降（稲泉，1969）。粟野町山ノ神（稲泉，1994）。栃木市太平山（吉富，1996）他。

126. ヤツボシハムシ *Gonioctena nigroplagiata* Baly

平地～低山地の河川林などに自生するエノキにつくが，生息地は局限されている。

採集データ：黒羽町片田，5-VII-1997，7 exs.，田中（清）。真岡市下籠谷，29-VI-1966，1 ex.，小林。田沼町長谷場，27-V-1998，2 exs.，稲泉。

文献記録：黒磯市鍋掛・那珂川（佐藤・大桃，1995）。塩原町宇都野（尾田，1956）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。宇都宮市柳田緑地（稲泉・佐藤，1996）他。

127. トホシハムシ *Gonioctena japonica* Chūjō et Kimoto

山地帯のヤシャブシ，ヤマハンノキにチャイロサルハムシ，ルリハムシと共に多数見られる。

採集データ：黒磯市百村・矢沢，16-V-1979，2 exs.，稲泉。栗山村湯西川，29-VII-1981，1 ex.，新田。日光市志津，5-VIII-1996，1 ex.，根本。足尾町地蔵坂，21-VI-1998，1 ex.，高橋（滋）他。

文献記録：那須岳三本槍（稲泉，1959）。藤原町上三依（稲泉，1985 a）。日光市西の湖（稲泉，1986 c）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）他。

128. ヤナギトホシハムシ *Gonioctena honshuensis* Nakane

県内では黒磯市及び栗山村の2地域からのみ記録されている。

文献記録：黒磯市百村・大川林道（佐藤・大川，1998）．
栗山村湯西川（稲泉，1983 a）他．

129. ヒメトホシハムシ *Gonioctena takahashii* Kimoto
Kimoto (1963) により Nikko 他から新種として記載された種である（Kimoto, 1964より引用）．その後、
県内では那須岳などからの記録があるが少ない．

採集データ：黒磯市三斗小屋，9-VII-1974，1ex.，田中（正）．

文献記録：那須茶臼岳～南月山（佐藤ら，1998）．日光市志津林道，塩原町八方ヶ原（佐藤ら，1999）他．

130. サクラムジハムシ *Gonioctena morimotoi* Kimoto
県北西部の山地帯から記録されている．

採集データ：那須町八幡，28-V-1961，1ex.，福田（南）．栗山村湯西川，29-VII-1981，1ex.，新田．日光市赤沼，6-VIII-1996，1ex.，田中（隆）他．

文献記録：黒磯市沼ッ原（佐藤・大桃，1995）．栗山村川俣（滝沢・佐藤，1998）．粟野町横根山（稲泉，1988）他．

131. ヒラノトホシハムシ *Gonioctena hiranoi* Takizawa

県内記録は下記の3地域から知られるのみである．

採集データ：鹿沼市古峰ヶ原，1-VIII-1988，1ex.，宮本．

文献記録：黒磯市沼ッ原（佐藤・大川，1998）．栗山村湯西川（大桃・佐藤，1992）他．

132. カンバムジハムシ *Gonioctena kamiyai* Kimoto
県北西部の山地帯から記録されているが，個体数は少ない．

採集データ：黒磯市麦飯坂，21-VI-1979，1ex.，稲泉．塩原町新湯，23-VII-1967，1ex.，稲泉他．

文献記録：栗山村湯西川（大桃・佐藤，1992）．鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）他．

133. オオホソルリハムシ *Phratora grandis* (Chūjō)

県内記録は下記の2地点である．那須岳では尾根付近のミネヤナギに多い．

採集データ：黒磯市三斗小屋，1-VIII-1993，2 exs.，稲泉他．

文献記録：那須岳峰の茶屋（稲泉，1990 a）．足利市松田川上流（大川，1990）他．

134. アカソハムシ *Potaninia cyrtionoides* (Jacoby)
生息地は県西南部の低山地に集中している．

採集データ：粟野町尾出，6-VI-1996，1ex.，廣永．栃木市出流町，16-V-1998，10 exs.，稲泉．葛生町秋山，29-IV-1998，4 exs.，稲泉他．

文献記録：鹿沼市上久我・石裂（佐藤・大桃，1992）．田沼町作原（佐藤ら，1998）他．

ヒゲナガハムシ亜科 Galerucinae

135. ズグロアラメハムシ *Lochmaea caprae* (Linnaeus)
山地帯に広く分布し，ヤナギ類につく．

採集データ：那須町豊原乙・常民夕狩，15-VI-1997，2 exs.，佐藤．藤原町枯木沼，11-VII-1995，1ex.，稲泉．日光市戦場ヶ原，14-IX-1982，2 exs.，稲泉他．

文献記録：黒羽町八溝山，馬頭町鴛子山（稲泉，1990 c）．栗山村湯西川（滝沢・佐藤，1998）．足尾町花柄（稲泉，1994）他．

136. アザミオオハムシ *Galeruca vicina* Solsky

低山地～山地にかけてアザミ類で見られる．

採集データ：那須町弁天，13-VII-1962，1ex.，福田（南）．塩原町新湯，23-VII-1967，5 exs.，稲泉．日光市湯元，11-VIII-1970，1ex.，稲泉他．

文献記録：黒磯市板室（佐藤・大川，1998）．藤原町上三依（稲泉，1985 a）．日光市千手（稲泉・福田，1972）．鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）．足利市渡良瀬川（大川，1990）他．

137. ネギオオアラメハムシ *Galeruca extensa* Motschulsky

ネギ類の害虫として知られ，1971年6月に宇都宮市田野町で，約30haのラッキョウ畑に大発生したことがある（稲泉，1982 a）．その他の記録としては，次の2例がある．

文献記録：鹿沼市上南摩（滝沢，1994）．小山市出井（滝沢・小池，1998）．

138. イチゴハムシ *Galerucella grisescens* (Joannis)

イチゴの害虫として知られるが，県内での被害の報告はないと思われる．平地～丘陵地の湿地や沢沿いでオオミゾソバなどのタデ類に多く見られる．

採集データ：黒羽町両郷，4-VI-1994，1ex.，稲泉．小川町片平，14-V-1996，1ex.，香川．茂木町飯，18-VI-1997，3 exs.，香川．田沼町下彦間，20-VI-1998，1ex.，稲泉他．

文献記録：黒磯市寺子（佐藤・大川，1998）．西那須野町乃木神社（加藤，1970）．今市市木和田島・弁天沼（稲泉ら，1995）．宇都宮市寺内沼（稲泉・佐藤，1996）．小山市渡良瀬遊水池（大川，1997）他．

139. ジュンサイハムシ *Galerucella nipponensis* (Laboissière)

県外ではジュンサイの害虫となるところもあるが，本県内ではむしろ珍しい種で，下記の3地点の池沼から知られるのみである．

採集データ：小川町片平，14-V-1996，1ex.，稲泉他．

文献記録：喜連川町上河戸（大桃・佐藤，1992）．藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997；ヒシの葉上に多い）他．

140. イタヤハムシ *Pyrrhalta fuscipennis* (Jacoby)
山地帯に広く分布し，カエデ類につく。

採集データ：黒磯市深山ダム，1-VIII-1994，2 exs.，
齊藤（伸）．栗山村八丁の湯，28-VII-1964，2 exs.，
稲泉．日光市切込湖，1-X-1995，1 ex.，高橋（滋）他．

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990 c）．藤原町上三
依（稲泉，1985 a）．馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）．鹿
沼市上南摩（滝沢，1994）他．

141. エノキハムシ *Pyrrhalta tibialis* (Baly)

平地～山地の雑木林周辺に自生するエノキ類につく。

採集データ：氏家町勝山，6-IX-1997，1 ex.，香川．
宇都宮市峰町，2-X-1990，2 exs.，加進他．

文献記録：黒磯市百村・大川林道（佐藤・大川，1998）．
鹿沼市日光奈良部町・黒川（佐藤・大桃，1992）．足利
市樺崎入谷（大川，1990）．小山市出井（滝沢・小池，
1998）他．

142. カエデハムシ *Pyrrhalta seminigra* (Jacoby)

県内記録は北西部の山地帯に限られている。

採集データ：黒磯市沼ソ原，1-VIII-1994，1 ex.，田中
（隆）．栗山村日光沢，2-VIII-1995，2 exs.，阿部他．

文献記録：塩原町新湯（稲泉ら，1987）．足尾町銀山
平（稲泉，1994）他．

143. ハンバミハムシ *Pyrrhalta lineola* (Fabricius)

これまで知られた分布は北海道，山形県であったが，
本県でも下記から記録された。

文献記録：那須町高久甲，同大島，上河内町謡辻，宇
都宮市長岡町（佐藤・大桃，1995）．

144. アカタデハムシ *Pyrrhalta semifulva* (Jacoby)

平地～山地に広く分布し，サクラ類やズミに見られる。

採集データ：黒磯市百村・大川林道，2-VIII-1994，
1 ex.，市川．矢板市長井，1-VI-1988，1 ex.，稲泉．喜
連川町上河戸，22-VII-1988，2 exs.，稲泉．宇都宮市江
曾島町，24-VII-1989，5 exs.，園部．西方町真名子，
27-VII-1998，1 ex.，稲泉．

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990 c）．栗山村湯
西川（滝沢・佐藤，1998）．日光市小倉山（稲泉，
1986 c）．鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）．栃木市太平山
（吉富，1996）．

145. オオサクラケブカハムシ *Pyrrhalta takeii* (Chūjō)

県内では次の2地点から2個体の古い記録があるのみ
である。

文献記録：那須岳，日光市中禅寺（稲泉，1982 c）．

146. ブチヒゲケブカハムシ *Pyrrhalta annulicornis*
(Baly)

低山地～山地帯にかけてガマズミなどに見られる。

採集データ：黒磯市百村・大巻川，5-VIII-1994，
1 ex.，香川．栗山村手白沢，31-VII-1964，1 ex.，稲泉．
日光市湫沼，7-VIII-1996，1 ex.，石川．茂木町飯，
18-VI-1997，1 ex.，稲泉．田沼町黒沢，21-VI-1998，
1 ex.，稲泉他．

文献記録：黒磯市百村・塩那スカイライン（佐藤・大
川，1998）．矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，
1993）．今市市木和田島・弁天沼（稲泉ら，1995）．益子
町雨巻山（稲泉，1990 c）他．

147. サンゴジュハムシ *Pyrrhalta humeralis* (Chen)

平地～山地にかけてガマズミやサンゴジュに多い。

採集データ：那須町大島，19-IX-1994，5 exs.，稲泉．
栗山村湯西川，8-VII-1982，1 ex.，石塚．日光市田母沢，
11-XI-1970，11 exs.，稲泉．烏山町小木須，28-VII-
1997，1 ex.，香川．足利市赤雪山，9-VIII-1998，1 ex.，
稲泉他．

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）．藤原町
上三依（稲泉，1985 a）．大田原市藤沢（加藤，1970）．
宇都宮市七久保溜（稲泉・佐藤，1996）．小山市出井
（滝沢・小池，1998）他．

148. ニレハムシ *Pyrrhalta maculicollis* (Mots-
chulsky)

平地～低山地のニレ，ケヤキに見られる。

採集データ：栗山村湯西川，24-VI-1980，1 ex.，稲泉．
今市市小休戸，19-VII-1996，1 ex.，稲泉．烏山町下境，
29-VII-1997，1 ex.，小林他．

文献記録：黒磯市赤坂（佐藤・大川，1998）．藤原町
中三依（滝沢・佐藤，1998）．馬頭町鷺子山（稲泉，
1990 c）．宇都宮市鶴田沼（稲泉・佐藤，1996）．栃木市
尻内（吉富，1994；冬季にケヤキの樹皮下より得た）他．

149. ウエツキブナハムシ *Chujoa uetsukii* (Chūjō)

筆者の知る記録は次の1例のみ。

文献記録：八溝山（稲泉，1987）．

150. ブタクサハムシ *Ophraella communis* LeSage
(Plate の4)

1997年に埼玉県内から日本で初めて発見された種であ
るが，1998年現在，本県では南部から中央部まで分布が
拡大している。

採集データ：宇都宮市峰町，6-IX-1997，5 exs.，稲泉
（サナギ，9-IXに羽化；他にも十数個体の幼虫，サナギ
を目撃），28-XI-1997，1 ex.，稲泉（終見），20-IV-1998，
2 exs.，稲泉（初見）．田沼町栃本，20-VI-1998，4 exs.，

香川. 足利市迫間湿地, 8-VIII-1998, 1ex., 田中(清)他
文献記録: 宇都宮市睦町(園部, 1998). 小山市出井(滝沢・小池, 1998).

151. アオバホソハムシ *Apophyllia viridipennis* (Jacoby)

これまで見つかった県内の生息地は下記の3カ所である。

文献記録: 那須町高久・小深堀(佐藤ら, 1994). 藤原町上三依(稲泉, 1980). 栗山村土呂部(佐藤・大桃, 1992; ヤマハッカ, アキノタムラソウより得た).

152. ウリハムシ *Aulacophora indica* (Gmelin)

平地～低山地の畑作地帯に多く、ウリ類の害虫となる。
採集データ: 那須町稲沢, 8-V-1995, 1ex., 香川. 塩原町和田山, 18-V-1995, 4exs., 稲泉. 塩谷町船生, 11-IX-1996, 3exs., 稲泉. 宇都宮市上横田, 7-IX-1968, 1ex., 日向. 藤岡町渡良瀬遊水池, 8-VIII-1998, 1ex., 江頭他.

文献記録: 黒磯市越堀(佐藤・大川, 1998). 矢板市泉(稲泉, 1970b; 冬季にケヤキの樹皮下より得た). 小川町・那珂川(稲泉, 1970b; 冬季に川岸に直立する砂岩壁内より得た). 益子町高館山(稲泉, 1990c). 足利市名草(稲泉, 1989c)他.

153. クロウリハムシ *Aulacophora nigripennis* Motschulsky

本種もウリ類の害虫として知られるが、本県内では農作物よりも野生種についていることが多い。

採集データ: 栗山村湯西川, 11-VIII-1980, 1ex., 稲泉. 喜連川町上河戸, 3-X-1988, 1ex., 稲泉. 鹿沼市岩山, 15-V-1970, 1ex., 稲泉. 佐野市寺久保町, 9-VIII-1998, 1ex., 鶴沢他.

文献記録: 黒磯市戸田(佐藤・大川, 1998). 馬頭町鷺子山(稲泉, 1990c; カボチャより得た). 宇都宮市鶴田沼(佐藤ら, 1992). 藤岡町渡良瀬遊水池(稲泉・香川, 1991; フジの葉に群生し摂食)他.

154. ヨツボシハムシ *Paridea quadriplagiata* (Baly)

平地～低山地に広く分布する。

採集データ: 茂木町鎌倉山, 24-IV-1997, 2exs., 稲泉. 鹿沼市寄栗, 29-XII-1969, 1ex., 稲泉. 田沼町長谷場, 27-V-1998, 5exs., 稲泉他.

文献記録: 黒磯市寺子(佐藤・大川, 1998). 小川町・那珂川(稲泉, 1970b; 河岸に直立する凝灰岩質の岩盤下に多数越冬). 馬頭町鷺子山, 1990c; ミヤマニガウリより得た). 宇都宮市柳田緑地(稲泉・佐藤, 1996). 栃木市鍋山町(吉富, 1994; 冬季にケヤキ樹皮下より得た)他.

155. アトボシハムシ *Paridea angulicollis* (Motschulsky)

平地～低山地にかけてアマチャズルに多く見られる。

採集データ: 那須町大和須, 4-VI-1994, 6exs., 稲泉. 栗山村日光沢, 3-V-1959, 1ex., 田中(正). 日光市西小来川, 23-VIII-1983, 1ex., 稲泉. 宇都宮市峰町, 6-VI-1970, 1ex., 高橋(滋). 田沼町熊鷹山, 8-VIII-1998, 1ex., 北原他.

文献記録: 黒磯市百村・大川林道(佐藤・大川, 1998). 塩原町塩の湯(稲泉ら, 1987). 今市市木和田島・弁天沼(稲泉ら, 1995). 真岡市下籠谷(稲泉ら, 1997; 雑木林の落葉下で越冬中). 栃木市太平山(吉富, 1996)他.

156. クロバヒゲナガハムシ *Taumacera tibialis* (Jacoby)

Jacoby (1885b) が Nikko 他から新種として記載した種である。低山地に広く分布するが、個体数はあまり多くないようである。

採集データ: 栗山村湯西川, 25-VIII-1981, 1ex., 杉本. 鹿沼市石裂山, 8-VII-1997, 1ex., 佐藤. 田沼町熊鷹山, 8-VIII-1998, 1ex., 香川他.

文献記録: 藤原町横川(稲泉, 1991c). 栗山村日陰(滝沢・佐藤, 1998). 馬頭町鷺子山(稲泉, 1990c). 鹿沼市上南摩(滝沢, 1994). 足利市寺岡町(大川, 1990).

157. クワハムシ *Fleutiauxia armata* (Baly)

平地～山地にかけて種々の草葉上に多い。

採集データ: 黒磯市三斗小屋, 2-VIII-1993, 1ex., 高橋(滋). 塩原町大沼, 7-VI-1995, 5exs., 稲泉. 馬頭町小口, 14-V-1996, 3exs., 稲泉. 茂木町鮎田, 1-VI-1997, 1ex., 小林. 田沼町白岩, 27-V-1998, 2exs., 香川他.

文献記録: 黒羽町八溝山(稲泉, 1990c). 栗山村馬坂林道(滝沢・佐藤, 1998). 日光市山久保(稲泉, 1986c). 足尾町皇海山(稲泉, 1994). 小山市出井(滝沢・小池, 1998)他.

158. クロセスジハムシ *Japonitata nigrita* (Jacoby)

これまで記録されたのは低山地の4地点である。

採集データ: 茂木町木幡, 30-IV-1997, 1ex., 香川.

文献記録: 今市市木和田島・弁天沼(稲泉ら, 1995). 鹿沼市古峰神社(稲泉, 1989b). 鹿沼市上南摩(滝沢, 1994).

159. クロバハラグリハムシ *Euliroetis abdominalis* (Baly)

県内記録は次の1例のみである。

文献記録: 藤岡町渡良瀬遊水池(丸山, 1998; 5月上

旬にアシの根元の土中より見つけた)。

160. キムネアオハムシ *Cneorane elegans* Baly

県内記録は次の4地点で少ない。

採集データ：栗山村土呂部，3-VII-1987，3 exs.，熊沢。

文献記録：塩原町大沼（稲泉ら，1987）。栗山村湯西川（滝沢・佐藤，1998）。塩谷町佐貫（加藤，1970）。日光市霧降（倉茂ら，1965；灯火飛来）他。

161. キアシヒゲナガアオハムシ *Clerotilia flavo-marginata* Jacoby

低山地から記録されているが，産地は局所的のようである。

採集データ：栗山村湯西川，31-VIII-1999，4 exs.，稲泉。日光市田母沢，7-VI-1982，1 ex.，高橋（滋）。茂木町鎌倉山，28-VI-1997，1 ex.，稲泉。

文献記録：那須町寺子丙（佐藤・大桃，1992；クロウメモドキ，イソノキより得た）。藤原町上三依（滝沢・佐藤，1998）。塩原町塩の湯（稲泉ら，1987）。足利市織姫山～行道山（大川，1990）他。

162. ハンノキハムシ *Agelastica coerulea* Baly

平地～山地に自生するハンノキに多い。

採集データ：黒磯市小佐飛，30-VII-1972，1 ex.，稲泉。藤原町竜王峽，24-V-1964，1 ex.，稲泉。小川町片平，14-V-1996，4 exs.，稲泉。市貝町多田羅沼，30-IV-1986，2 exs.，稲泉。足利市迫間湿地，8-VIII-1998，1 ex.，高橋（滋）他。

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）。栗山村日向（滝沢・佐藤，1998）。日光市千手（稲泉，1986 c）。宇都宮市中島町（稲泉ら，1997；雑木林内の落ち葉下で越冬中）。小山市出井（滝沢・小池，1998）他。

163. ケバカクロナガハムシ *Hesperomorpha hirsuta* Jacoby

Jacoby (1885 b) が Nikko 他 の 個 体 により，新種として記載した種である。低山地に広く分布する。

採集データ：栗山村湯西川，25-VI-1980，1 ex.，稲泉。粟野町上粕尾，21-VI-1998，1 ex.，小林。葛生町秋山，21-VI-1998，1 ex.，梨本他。

文献記録：黒磯市寺子（佐藤・大川，1998）。矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）。日光市東小来川（稲泉，1986 c）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）。足利市名草大坂（大川，1990）他。

164. ルリウスバハムシ *Stenoluperus cyaneus* (Baly)

平地～山地帯まで見られるが，分布の中心は山地帯と思われる。

採集データ：黒磯市沼ツ原，31-VII-1972，1 ex.，稲

泉。栗山村加仁湯，4-VIII-1995，1 ex.，阿部。日光市光徳，11-VII-1984，3 exs.，稲泉。上河内町羽黒山，26-VI-1997，3 exs.，香川。烏山町小木須，29-VII-1997，1 ex.，石川他。

文献記録：黒磯市三斗小屋（加藤，1970）。塩原町元湯（稲泉ら，1987）。栗野町横根山（稲泉ら，1988）。藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

165. ヒゲナガウスバハムシ *Stenoluperus nipponensis* (Laboissière)

山地帯の種々の葉上に多い。

採集データ：黒磯市百村・大巻川，5-VII-1994，2 exs.，稲泉。栗山村ウスコボ平，2-VIII-1995，1 ex.，廣永。今市市小林，12-VI-1996，10 exs.，稲泉。鹿沼市石裂山，28-V-1997，9 exs.，香川。田沼町黒沢，21-VI-1998，2 exs.，土屋他。

文献記録：那須岳ロープウェイ山麓駅付近（稲泉，1990 a）。塩原町大沼（稲泉ら，1987）。日光市山王峠（稲泉，1986 c）。粟野町井戸湿原（稲泉，1988）。足利市松田川上流（大川，1990）他。

166. チビウスバハムシ *Stenoluperus bicarinatus* (Weise)

北西部の山地帯からの記録が多い。

採集データ：那須町茶臼岳～南月山，5-VII-1997，14 exs.，佐藤。日光市志津，3-VII-1998，1 ex.，佐藤。粟野町粕尾峠，18-V-1997，1 ex.，佐藤他。

文献記録：黒磯市三斗小屋（加藤，1970）。藤原町横川，栗山村川俣（滝沢・佐藤，1998）他。

167. フタスジヒメハムシ *Medythia nigrobilineata* (Motschulsky)

大豆の害虫となる。その他，畑地周辺などの草地に多い。

採集データ：栗山村湯西川，6-VII-1982，1 ex.，川上。塩谷町佐貫，29-VI-1996，1 ex.，稲泉。茂木町飯，18-VI-1997，1 ex.，稲泉。都賀町家中，9-VIII-1998，4 exs.，香川他。

文献記録：馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。宇都宮市長岡湿地（稲泉・佐藤，1996）。足利市渡良瀬川（大川，1990）他。

168. クロウスバハムシ *Luperus moorii* Baly

平地～山地にかけて，種々の葉上や花上に多い。

採集データ：黒磯市沼ツ原，27-VI-1986，1 ex.，稲泉。藤原町鶏頂山，11-VII-1995，1 ex.，稲泉。日光市男体山，7-VIII-1996，1 ex.，太田。宇都宮市峰町，10-V-1988，4 exs.，高橋（滋）（クサギ葉上より）。国分寺町小金井，24-V-1961，1 ex.，樋口他。

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）．矢板市尚仁沢（稲泉，1993；稲泉・香川，1993）．塩谷町玉生・東古屋（加藤，1970）．鹿沼市上南摩（滝沢，1994）．藤岡町渡良瀬遊水池（稲泉・香川，1991；エノキ葉裏に多数見られた）他．

169. ムナキホソヒゲナガハムシ *Luperus laricis supurius* Ogloblin

これまでの県内記録は，次の2地点からの3匹である．

文献記録：栗山村奥鬼怒（滝沢・佐藤，1998）．日光市馬立（女峰山登山口；福田，1976 b）．

170. オオルリヒメハムシ *Calomicrus nobyi* Chūjō
低山地～山地帯に広く分布する．

採集データ：栗山村湯西川，8-VII-1982，1ex.，石塚日光市霧降，17-V-1959，1ex.，稲泉．鹿沼市石裂山，28-V-1997，1ex.，稲泉．葛生町秋山，21-VI-1998，1ex.，梨本他．

文献記録：黒羽町八溝山頂（加藤，1970）．黒磯市百村・大川林道（佐藤・大川，1998）．矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）．鹿沼市上南摩（滝沢，1994）．田沼町氷室山（稲泉，1970 c）他．

171. ルリヒラタヒメハムシ *Calomicrus iniquus* (Weise)

県内からいくつかの記録が報告されているが，前種との混同なども見られ，今のところ確実な記録は次の一つのようなのである．

文献記録：日光市湯元（稲泉，1986 c）．

172. ハラグロヒメハムシ *Calomicrus cyaneus* (Jacoby)

Jacoby (1885 b) が Nikko 他 の 個 体 により新種として記載した種である．低山地～山地帯でボタンズルなどに多い．

採集データ：黒磯市三斗小屋，2-VIII-1993，1ex.，高橋（滋）．塩原町塩釜，24-VI-1969，1ex.，田中（正）．日光市霧降，15-VI-1958，1ex.，稲泉．栗野町上粕尾，21-VI-1998，1ex.，吉川．田沼町作原，21-VI-1998，4exs.，香川他．

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）．矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）．馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）．足尾町庚申山（稲泉，1994）．足利市小俣岩切（大川，1990）他．

173. キバラヒメハムシ *Exosoma flaviventre* (Motschulsky)

山地帯に広く分布し，イタドリなどの花に集まる．

採集データ：藤原町上三依，28-VII-1991，6exs.，稲

泉．烏山町小木須，29-VII-1997，1ex.，稲泉．田沼町飛駒，20-VI-1998，3 exs.，稲泉他．

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）．黒磯市高林（佐藤・大川，1998）．栗山村上栗山（稲泉ら，1990）．日光市湯元（稲泉，1982 a）．鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）．小山市出井（滝沢・小池，1998）他．

174. ハラマダラヒメハムシ *Exosoma akkoe* (Chūjō)
県北西部の山地帯に見られる．

採集データ：黒磯市百村・大川林道，1-VIII-1994，1ex.，宮．黒磯市塩那スカイライン，1-VIII-1994，5 exs.，山岸他．

文献記録：栗山村湯西川（稲泉ら，1990）．足尾町庚申山（稲泉，1992）．栗野町横根山（稲泉，1994）他．

175. ニセキバラヒメハムシ *Exosoma chujoi* (Nakane)
平地～低山地にかけてセンニンソウなどに見られる．

採集データ：黒磯市百村・大巻川，5-VII-1994，1ex.，稲泉．西方町真名子，27-VII-1998，3 exs.，香川他．

文献記録：藤原町横川，栗山村川俣（滝沢・佐藤，1998）．馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）．益子町雨巻山（稲泉，1989 a）．宇都宮市七久保溜（稲泉・佐藤，1996）．足利市名草（稲泉，1989 c）他．

176. ウリハムシモドキ *Atrachya menetriesi* (Faldernmann)

クローバー類の害虫として知られる．標高の高い所でも，人為的に造成された草地などに見られる．

採集データ：黒磯市沼ッ原，31-VII-1972，1ex.，稲泉．藤原町鷄頂山，11-VII-1995，1ex.，稲泉．日光市菖蒲，6-VIII-1996，2 exs.，松原．烏山町松倉山，30-VII-1997，2 exs.，稲泉．佐野市唐沢山，8-VI-1998，1ex.，香川他．

文献記録：那須町湯本（大野，1964）．栗山村野門（滝沢・佐藤，1998）．馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）．宇都宮市長岡湿地（佐藤，1996）．小山市渡良瀬遊水池（大川，1997）他．

177. ウスイロウリハムシ *Monolepta pallidula* (Baly)

平地～低山地に見られるが，発見例はあまり多くない．

採集データ：塩谷町船生・百目鬼，11-IX-1996，1ex.，稲泉．栗山村湯西川，31-VIII-1999，10 exs.，稲泉．文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）．宇都宮市東峰町（稲泉，1984 b；エゴノキ葉上に多い）．宇都宮市駒生湿地（稲泉・佐藤，1996；ハギの1種の葉上に多い）他．

178. ムネアカウスイロハムシ *Monolepta kurosawai* Chūjō et Ohno

これまでの県内記録は次の3カ所である．

採集データ：田沼町白岩，27-V-1998，1ex.，稲泉。
文献記録：馬頭町鷺子山（稲泉，1984 b；1990 c）。足利市小俣岩切（大川，1990）。

179. ヒウラアシナガハムシ *Monolepta hiurai* Kimoto
県内では下記の2地点から記録されており，両産地とも個体数は少なくない。

採集データ：栗山村湯西川，31-VIII-1999，9 exs.，稲泉（人工的に造成された禾本科植物の多い草地にウスイロウリハムシと混棲）。

文献記録：栗山村湯西川（佐藤・大桃，1992）。那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）。

180. ホタルハムシ *Monolepta dichroa* Harold
平地の草地や畑地周辺に多い。

採集データ：塩原町轟沼，13-IX-1995，6 exs.，稲泉。上河内町羽黒山麓，26-VI-1997，8 exs.，稲泉（休耕田のタデ科植物に群生）。宇都宮市東峰町，10-VII-1985，1ex.，稲泉（灯火飛来）。都賀町家中，9-VIII-1998，2 exs.，香川他。

文献記録：黒磯市豊岡（佐藤・大川，1998）。栗山村上栗山（稲泉ら，1990；カボチャに多い）。馬頭町鷺子山麓（稲泉，1990 c；シロツメクサに多い）。足尾町深沢（稲泉，1994）。足利市渡良瀬川（大川，1990）他。

181. ムナグロツヤハムシ *Arthrotus niger* Motschulsky

平地～山地にかけて種々の葉上に最も普通。

採集データ：黒磯市木の俣沢，21-VI-1970，2 exs.，稲泉。藤原町川治，28-VI-1953，4 exs.，田中（正）。今市市小林，12-VI-1996，1ex.，香川。市貝町多田羅沼，24-IV-1990，7 exs.，高橋（滋）。佐野市寺久保町，9-VIII-1998，3 exs.，鶴沢他。

文献記録：那須町湯本（大野，1964）。栗山村日光沢（稲泉・香川，1992）。日光市戦場ヶ原（稲泉，1986 c）。宇都宮市上籠谷（稲泉・佐藤，1996）。栃木市太平山（吉富，1996）他。

182. アオバノコヒゲハムシ *Sphenoraia intermedia* Jacoby

低山地に広く分布する。

採集データ：塩原町和田山，18-V-1995，1ex.，香川。上河内町羽黒山，26-VI-1997，1ex.，稲泉。茂木町鎌倉山，24-IV-1997，1ex.，稲泉。葛生町秋山，21-VI-1998，1ex.，小林他。

文献記録：栗山村湯西川（滝沢・佐藤，1998）。今市市木和田島・弁天沼（稲泉ら，1995）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。足利市松田川上流（大川，1990）他。

183. キクビアオハムシ *Agelasa nigriceps* Motschulsky

低山地～山地にかけて多く見られる。

採集データ：黒磯市小佐飛，30-VII-1972，1ex.，稲泉。塩原町新湯，17-VII-1960，1ex.，関口。日光市湯元，24-VI-1970，2 exs.，稲泉。鹿沼市石裂山，28-V-1997，3 exs.，稲泉。葛生町前沢，9-VIII-1998，2 exs.，高橋（優）他。

文献記録：那須町湯本（大野，1964；サルナシより）。栗山村土呂部（滝沢・佐藤，1998）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c；キブシより）。益子町雨巻山（稲泉，1990 c；オオバアサガラより）。足利市小俣岩切（大川，1990）他。

184. イタドリハムシ *Gallerucida bifasciata* Motschulsky

平地～山地のイタドリ，ギシギシなどに多い。

採集データ：黒磯市大川林道，1-VIII-1994，1ex.，川田。栗山村湯西川，28-VII-1981，1ex.，江尻。日光市小田代ヶ原，11-VII-1984，2 exs.，稲泉。茂木町大瀬，24-IV-1997，1ex.，香川。葛生町柿平，29-IV-1998，3 exs.，稲泉他。

文献記録：黒羽町雲巖寺，馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。藤原町上三依（稲泉，1985 a）。足尾町銀山平（稲泉，1994）。野木町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

185. ズグロアカハムシ *Gallerucida flavipennis* (Solsky)

低山地のノブドウにつくが発見例は少ない。

文献記録：黒磯市萩平（佐藤・大桃，1996）。矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）。日光市小倉山（稲泉，1986 c）。宇都宮市古賀志山（稲泉，1970 c）。足利市松田川上流（大川，1990）。

ノミハムシ亜科 Alticinae

186. スジカミナリハムシ *Altica latericosta subcostata* Ohno

河原のヤナギ類に見られる。

採集データ：栗山村湯西川，6-VII-1982，1ex.，稲泉。小川町，5-X-1969，3 exs.，稲泉。宇都宮市石井町・鬼怒川，1-V-1993，1ex.，中村。田沼町飛駒，20-VI-1998，3 exs.，稲泉他。

文献記録：大田原市佐久山・箒川河原（加藤，1970）。小山市思川（滝沢・小池，1998）。

187. コカミナリハムシ *Altica viridicyanea* (Baly)

下記の低山地から記録されている。

採集データ：那須町豊原乙・常民夕狩，15-VI-1997，

2 exs., 佐藤. 足利市石尊山, 8-VIII-1998, 1ex., 稲泉
文献記録: 藤原町横川, 栗山村奥鬼怒 (滝沢・佐藤,
1998). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994).

188. アカバナトビハムシ *Altica oleracea* (Linnaeus)
平地～山地帯のアカバナやマツヨイグサ類に多い。

採集データ: 那須町稲沢, 8-V-1994, 3 exs., 香川.
矢板市尚仁沢, 5-X-1984, 7 exs., 稲泉. 日光市男体山,
5-VIII-1982, 3 exs., 稲泉. 宇都宮市石井町, 10-VI-
1960, 1ex., 稲泉. 田沼町栃本, 20-VI-1998, 8exs., 香
川他.

文献記録: 黒磯市島方 (佐藤・大川, 1998). 栗山村
日光沢 (稲泉・香川, 1992). 今市市木和田島・弁天沼
(稲泉ら, 1995). 粟野町横根山 (稲泉ら, 1988). 足利
市深高山 (稲泉, 1989c) 他.

189. アザミカミナリハムシ *Altica cirscicola* Ohno
低山地～山地のアザミ類に多い。

採集データ: 那須町大島, 19-IX-1994, 6exs., 稲泉.
栗山村手白沢, 19-VI-1988, 2 exs., 田中 (正). 日光市
小倉山, 8-VI-1984, 4 exs., 稲泉. 塩谷町船生, 11-IX-
1996, 3 exs., 稲泉. 益子町雨巻山, 8-X-1970, 3 exs.,
稲泉他.

文献記録: 黒磯市木綿畑 (佐藤・大川, 1998). 矢板
市泉 (加藤, 1970). 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990c). 足
尾町松木沢 (稲泉, 1994). 足利市名草大坂 (大川,
1990) 他.

190. クロサワカミナリハムシ *Altica kurosawai* Ohno
低山地のゲンノショウコに見られる。

採集データ: 日光市小倉山, 13-IX-1983, 1ex., 稲泉.
茂木町飯, 18-VI-1997, 2exs., 稲泉他.

文献記録: 黒羽町八溝山, 馬頭町鷺子山 (稲泉,
1990c). 矢板市八方ヶ原 (加藤, 1970). 鹿沼市上南摩
(滝沢, 1994) 他.

191. イチゴカミナリハムシ *Altica fragariae* (Nakane)
西日本では栽培イチゴの害虫となるが, 本県では平地
のヘビイチゴ類に見られる。

採集データ: 小川町片平, 14-V-1996, 1ex., 稲泉.
西方町金崎, 22-XI-1968, 1ex., 斉藤 (浩). 大平町,
21-VI-1989, 6 exs., 園部 (オヘビイチゴより).

文献記録: 日光市田母沢 (稲泉, 1984a; ハクサンフ
ウロより). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 足利市名草大
坂 (大川, 1990).

192. カミナリハムシ *Altica cyanea* (Weber)

県内からの確かな記録は次の3例で少ない。

文献記録: 宇都宮市鶴田沼 (佐藤ら, 1992). 鹿沼市
上南摩 (滝沢, 1994). 藤岡町渡良瀬遊水池 (佐藤ら,

1998; イボクサより).

193. ニホンカミナリハムシ *Altica nipponica* Ohno

Ohno (1960) が Nikko 他を基産地として記載した
種である。種の同定が難しいためか, 県内からの記録は
少ない。

採集データ: 那須町豊原乙・常民夕狩, 15-VI-1997,
2 exs., 佐藤.

文献記録: 栗山村女夫淵, 同田代山, 同湯西川 (滝沢・
佐藤, 1998). 藤岡町渡良瀬遊水池 (大川, 1997).

194. ミズタマソウカミナリハムシ *Altica circaeae* Ohno
低山地のミズタマソウで見られる。

採集データ: 那須町大和須, 4-VI-1994, 2 exs., 稲泉.
栗山村加仁湯, 3-VIII-1995, 2 exs., 香川. 日光市西小
来川, 31-V-1984, 7 exs., 稲泉. 烏山町横枕, 18-V-
1997, 4 exs., 稲泉. 田沼町長谷場, 27-V-1998, 4 exs.,
稲泉他.

文献記録: 黒羽町八溝山 (稲泉, 1990c). 鹿沼市上
南摩 (滝沢, 1994).

195. キタカミナリハムシ *Altica japonica* Ohno

平地の湿地や池沼に見られる。

採集データ: 喜連川町上河戸, 6-V-1988, 1ex., 稲泉.
市貝町多田羅沼, 30-IV-1986, 3 exs., 稲泉. 葛生町柿
平, 29-IV-1998, 3 exs., 稲泉他.

文献記録: 黒磯市上黒磯 (佐藤・大川, 1998). 西那
須野町加治屋 (加藤, 1970). 今市市木和田島・弁天沼
(稲泉ら, 1995). 宇都宮市寅巳湿地 (稲泉・佐藤, 1996).
小山市出井 (滝沢・小池, 1998) 他.

196. ヒメカミナリハムシ *Altica caerulescens* (Baly)

平地の堤防や水田付近に自生するエノキグサに多い。

採集データ: 塩谷町船生, 11-IX-1996, 10 exs., 稲泉.
宇都宮市峰町, 7-V-1958, 1ex., 稲泉. 足利市石尊山,
8-VIII-1998, 1ex., 稲泉他.

文献記録: 黒磯市大原間 (佐藤・大川, 1998). 大田
原市大神 (加藤, 1970). 南那須町鴻野山 (稲泉,
1991b). 小山市思川 (滝沢・小池, 1998) 他.

197. フクタカミナリハムシ *Altica fukutai* Nakane

文献記録: 那須町高久・小深堀 (佐藤ら, 1994). 益
子町雨巻山 (稲泉, 1986a; ミズタマソウより). 鹿沼
市上南摩 (滝沢, 1994).

本種は今後の再検討により別の種である可能性もある。

198. ホソリトビハムシ *Aphthonaltica angustata*
(Baly)

低山地のアケビ類に多い。

採集データ: 那須町豊原甲, 3-V-1994, 9 exs., 稲泉.
茂木町鎌倉山, 24-IV-1997, 1ex., 稲泉. 栃木市出流町,

16-V-1998, 3exs., 香川他。

文献記録：矢板市尚仁沢（稲泉ら, 1993; 稲泉・香川, 1993). 日光市東小来川（稲泉, 1986 c). 鹿沼市上南摩（滝沢, 1994). 足利市小俣岩切（大川, 1990）他。

199. アラハダトビハムシ *Zipangia lewisi* (Jacoby)
Jacoby (1885 b) が Chiuzenji 他より新種として記載した種である。山地帯のガマズミなどで見られる。

採集データ：黒磯市三斗小屋, 1-VIII-1993, 2 exs., 稲泉. 塩原町新湯, 17-VII-1960, 1ex., 関口. 上河内町羽黒山, 26-VI-1997, 1ex., 稲泉.

文献記録：藤原町横川（稲泉, 1991 c). 日光市湯元（稲泉, 1986 c). 鹿沼市古峰ヶ原（稲泉, 1994）他。

200. ガマズミトビハムシ *Zipangia obscura* (Jacoby)
平地にも見られるが、分布の中心は山地帯で、スイカズラやウツギ類に多い。

採集データ：黒磯市沼ッ原, 27-VI-1986, 2 exs., 稲泉. 矢板市長井, 6-VI-1990, 3 exs., 稲泉. 日光市竜頭, 10-VI-1983, 6 exs., 稲泉. 真岡市下籠谷, 5-VII-1993, 1ex., 稲泉他。

文献記録：黒磯市三斗小屋（稲泉, 1990 a). 栗山村日光沢（稲泉・香川, 1992). 日光市戦場ヶ原（稲泉, 1986 c). 鹿沼市古峰ヶ原（稲泉, 1994). 小山市出井（滝沢・小池, 1998）他。

201. チビカミナリハムシ *Zipanginia picipes* (Baly)
これまでの県内記録は下記の3例である。

文献記録：栗山村日陰・峰の沢（滝沢・佐藤, 1998). 塩谷町上平・鬼怒川（佐藤・大桃, 1996). 日光市清滝・大谷川（佐藤ら, 1998）。

202. ヒメトビハムシ *Orthocrepis adamsii* (Baly)
県内では唯一つ下記の記録がある。

文献記録：鹿沼市上南摩（滝沢, 1994）。

203. クロコトビハムシ *Manobia parvula* (Baly)

県内記録は下記の2地点のみである。鹿沼市の産地では多数得られている。

文献記録：鹿沼市上南摩（滝沢, 1994). 宇都宮市駒生湿地（稲泉・佐藤, 1996）。

204. セスジトビハムシ *Lipromela minutissima* (Pic)
県内記録は下記の他に1例が知られるのみで少ない。

採集データ：黒磯市百村・大巻川, 5-VII-1994, 7 exs., 稲泉（ハクウンボクより）。栗山村八丁の湯, 4-VIII-1990, 3 exs., 稲泉他。

文献記録：藤原町中三依（佐藤・大桃, 1995）。矢板市尚仁沢（稲泉ら, 1993; 稲泉・香川, 1993）。

205. チャバネツヤハムシ *Phygasia fulvipennis* (Baly)
平地～低山地のガガイモに見られる。

採集データ：宇都宮市峰町, 24-IV-1991, 3 exs., 高橋（滋）。烏山町滝, 18-V-1997, 1ex., 稲泉. 田沼町長谷場, 27-V-1998, 1ex., 香川他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤, 1998）。宇都宮市徳次郎（福田, 1971 b）。藤岡町渡良瀬遊水池（福田, 1988）他。

206. フタホシオオノミハムシ *Pseudodera xanthospila* Baly

平地～低山地にかけてサルトリイバラに多い。

採集データ：那須町大和須, 4-VI-1994, 1ex., 稲泉. 塩原町塩釜, 30-V-1968, 5 exs., 田中（正）。今市市小林, 12-VI-1996, 7 exs., 稲泉. 宇都宮市鶴田沼, 13-V-1962, 1ex., 渡辺（一）。佐野市唐沢山, 8-VI-1998, 2exs., 香川他。

文献記録：黒磯市戸田（佐藤・大川, 1998）。栗山村川俣（滝沢・佐藤, 1998）。日光市小倉山（稲泉, 1986 c）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉, 1994）。足利市迫間湿地（大川, 1990）他。

207. ナガトビハムシ *Liprus punctatostriatus* Motschulsky

平地～低山地のギボウシ類に多く見られる。

採集データ：黒羽町両郷, 4-VI-1994, 1ex., 稲泉. 塩原町和田山, 18-V-1995, 1ex., 香川. 日光市霧降, 22-V-1960, 1ex., 稲泉. 鹿沼市石裂山, 28-V-1997, 1ex., 稲泉. 岩舟町岩舟山, 19-IV-1995, 1ex., 山岸他。

文献記録：黒磯市高林（佐藤・大川, 1998）。栗山村手白沢（滝沢・佐藤, 1998）。馬頭町鷺子山（稲泉, 1990 c）。宇都宮市陸町（園部, 1997）。藤岡町渡良瀬遊水池（稲泉・香川, 1991）他。

208. カタクリハムシ *Sangariola punctatostriata* (Motschulsky)

平地～山地に生息し、ヤマジノホトトギスやヤマユリ、ウバユリなどに見られる。

採集データ：黒磯市三斗小屋, 1-VIII-1993, 5 exs., 高橋（滋）。塩原町大沼, 5-VI-1993, 3 exs., 稲泉. 日光市竜頭, 10-VI-1983, 3 exs., 稲泉. 宇都宮市東峰町, 19-V-1995, 1ex., 稲泉. 栃木市出流町, 16-V-1998, 1ex., 香川他。

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉, 1990 c）。藤原町上三依（稲泉, 1985 a）。今市市木和田島・弁天沼（稲泉ら, 1995）。益子町雨巻山（稲泉, 1990 c）。足利市名草大坂（大川, 1990）他。

209. ホオノキセダカトビハムシ *Lanka magnoliae* (Chūjō et Ohno)

平地～低山地のホオノキなどに見られる。

採集データ：那須町大島，19-IX-1994，1ex.，稲泉。
茂木町下小貫，1-VI-1997，1ex.，小林他。

文献記録：日光市小倉山（稲泉，1986c）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990c）。宇都宮市長岡湿地（稲泉・佐藤，1996；モクレンより）。足利市大岩山（大川，1990）他。

210. ハネナシトビハムシ *Batophila acutangula* Heikertinger

低山地～山地帯のクマイチゴやナガバモミジイチゴなどに多い。

採集データ：栗山村日光沢，4-VIII-1995，5exs.，稲泉。栃木市太平山，19-IX-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990c）。藤原町上三依（稲泉，1985a）。日光市山久保（稲泉，1986c）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）他。

211. ヒゲナガアラハダトビハムシ *Trachyaphthona sordida* (Baly)

低山地のヘクソカズラに多い。

採集データ：那須町大島，19-IX-1994，1ex.，稲泉。今市市小林，12-VI-1996，3exs.，稲泉。喜連川町上河戸，30-V-1988，1ex.，稲泉。鹿沼市上南摩，1-VII-1992，2exs.，稲泉。田沼町作原，20-VI-1998，3exs.，香川他。

文献記録：黒磯市杉渡土（佐藤・大川，1998）。塩谷町玉生・東古屋（加藤，1970）。宇都宮市七久保溜（稲泉・佐藤，1996）。小山市出井（滝沢・小池，1998）他。

212. ツブノミハムシ *Aphthona perminuta* Baly

平地～山地の種々の葉上に多い。

採集データ：那須町豊原，3-V-1994，10exs.，稲泉。塩原町和田山，18-V-1995，5exs.，稲泉。日光市湯元，24-VI-1970，4exs.，稲泉。宇都宮市古賀志山，29-IV-1970，7exs.，稲泉。田沼町熊鷹山，8-VIII-1998，2exs.，香川他。

文献記録：黒磯市三斗小屋（稲泉，1990a）。栗山村馬坂（滝沢・佐藤，1998）。今市市木和田島・弁天沼（稲泉ら，1995）。足尾町久良沢（稲泉，1994）。藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

213. サメハダツブノミハムシ *Aphthona strigosa* Baly

低山地のアカメガシワに多い。

採集データ：塩谷町船生，11-IX-1996，1ex.，稲泉。益子町高館山，23-VIII-1997，8exs.，稲泉。田沼町作原，21-VI-1998，2exs.，香川。佐野市唐沢山，8-VI-1998，7exs.，稲泉他。

文献記録：馬頭町鷺子山（稲泉，1990c）。宇都宮市新里町（福田，1982）。足利市松田川上流（大川，1990）他。

214. キイロツブノミハムシ *Aphthona foudrasi* Jacoby

県内からの確かな記録は次の1例と思われる。

文献記録：小山市出井（滝沢・小池，1998）。

215. アヤメツブノミハムシ *Aphthona interstitialis* Weise

低山地のアヤメ，ハナショウブなどに見られる。

採集データ：那須町豊原乙・常民夕狩，15-VI-1997，2exs.，佐藤。日光市小倉山，8-VI-1984，4exs.，稲泉他。

文献記録：黒磯市杉渡土（佐藤・大川，1998）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。足利市大岩山（大川，1990）他。

216. クロサワツブノミハムシ *Aphthona kurosawai* Ohno

平地の湿地に多く見られる。

採集データ：那須町稲沢，14-X-1994，3exs.，香川（タカトウダイより得た）。塩谷町佐貫，29-VI-1996，6exs.，稲泉。西方町真名子，27-VII-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：鹿沼市日吉町（稲泉，1985b）。宇都宮市駒生湿地（稲泉・佐藤，1996）。小山市渡良瀬遊水池（大川，1990）他。

217. トケジホソトビハムシ *Luperomorpha tokejii* Ohno

県内からの記録は次の3例のみである。

採集データ：那須町豊原乙・常民夕狩，15-VI-1997，4exs.，佐藤。田沼町長谷場，27-V-1998，4exs.，稲泉。

文献記録：葛生町豊代（佐藤ら，1998）。

218. クビアカトビハムシ *Luperomorpha pryeri* (Baly)

県内記録は低山地からの6例ほどである。

採集データ：西方町真名子，27-VII-1998，5exs.，稲泉他。

文献記録：黒磯市豊岡（佐藤・大川，1998）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990c）。足利市山下町・水道山（大川，1990）他。

219. ムネアカオオホソトビハムシ *Luperomorpha collaris* (Baly)

山地帯から記録されているが少ない。

採集データ：塩原町大沼，5-VI-1993，1ex.，稲泉他。

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990c）。矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1989a）。足尾町内の籠都沢（稲泉，1994）他。

220. クワノミハムシ *Luperomorpha funesta* (Baly)

平地～低山地で見られ，クワ畑の周辺などに多い。

採集データ：宇都宮市峰町，22-V-1987，4exs.，稲泉。足利市石尊山，8-VIII-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）。西那須

野町加治屋（加藤，1970）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。小山市渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

221. キアシノミハムシ *Luperomorpha tenebrosa* (Jacoby)

平地～低山地のフジ、クズ、ハギ類に多い。

採集データ：黒磯市百村・大巻川，5-VII-1994，1ex.，稲泉。塩原町新湯，21-VI-1959，1ex.，稲泉。日光市田母沢，11-VI-1982，7exs.，稲泉。烏山町滝，18-V-1997，2exs.，香川。田沼町白岩，27-V-1998，4exs.，稲泉他。

文献記録：大田原市城山公園（加藤，1970）。藤原町上三依（稲泉，1985 a）。今市市木和田島・弁天沼（稲泉ら，1995）。宇都宮市長岡湿地（稲泉・佐藤，1996）。足利市松田川上流（大川，1990）他。

222. キスジノミハムシ *Phyllotreta striolata* (Fabricius)

平地～山地帯まで分布し、アブラナ科蔬菜類の害虫となる。

採集データ：今市市小林，12-VI-1996，7exs.，稲泉。宇都宮市峰町，27-VI-1984，13exs.，稲泉。益子町七井，24-IV-1961，3exs.，稲泉。都賀町家中，9-VIII-1998，1ex.，香川他。

文献記録：那須町湯本（大野，1964）。日光市戦場ヶ原（稲泉，1986 c）。南那須町鴻野山（稲泉，1991 b）。藤岡町渡良瀬川遊水池（大川，1997）他。

223. ホソキスジノミハムシ *Phyllotreta rectilineata* Chen

県南部の平地から数例の記録がある。

採集データ：小山市下生井・渡良瀬遊水池，13-IV-1997，1ex.，佐藤。藤岡町渡良瀬遊水池，21-VI-1999，1ex.，稲泉。

文献記録：足利市迫間（草野，1988）。藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

224. チュウジョウキスジノミハムシ *Phyllotreta chujoe* Madar

これまでの県内記録は少なく，下記の4例と思われる。

採集データ：小山市下生井・渡良瀬遊水池，13-IV-1997，2exs.，佐藤。

文献記録：鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。宇都宮市長岡湿地（佐藤，1996）。小山市出井（滝沢・小池，1998）。

225. コクロアシナガトビハムシ *Longitarsus morrisonus* Chūjō

県中南部から記録されているが，あまり多くない。

採集データ：宇都宮市峰町，25-X-1991，1ex.，稲泉。

佐野市唐沢山，8-VI-1998，20exs.，稲泉他。

文献記録：日光市戦場ヶ原（稲泉，1970 c）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。足利市利保町（大川，1990）他。

226. オオバコトビハムシ *Longitarsus scutellaris* (Rey)

県内全域のオオバコに多い。

採集データ：黒磯市塩那スカイライン，1-VIII-1994，3exs.，香川。塩原町臺沼，13-IX-1995，4exs.，稲泉。日光市瀬沼，23-VII-1983，6exs.，稲泉。益子町大平，21-IX-1997，2exs.，稲泉。岩舟町三疊山，20-IV-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）。栗山村土呂部（稲泉ら，1990）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。宇都宮市鶴田沼（佐藤ら，1992）。藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

227. チュウジョウアシナガトビハムシ *Longitarsus ohnoi* Gruev

県内記録は唯一下記のみ。

文献記録：栗山村川俣（滝沢・佐藤，1998）。

228. イヌノフグリトビハムシ *Longitarsus holsaticus* (Linnaeus)

平地のイヌノフグリ類につく。

採集データ：今市市今市，11-XII-1968，1ex.，齊藤（浩）。鹿沼市下田町，17-XII-1968，1ex.，齊藤（浩）他。

文献記録：黒磯市寺子（佐藤・大川，1998）。小川町・那珂川河岸（加藤，1970）。宇都宮市石井町（稲泉，1976；冬季にイヌノフグリより得た）。上三川町三村（稲泉ら，1997；冬季に雑木林の落葉下より得た）。足利市迫間湿地（大川，1990）他。

229. ヒルガオトビハムシ *Longitarsus adamsii* (Baly)

県内記録は下記の1例のみである。

文献記録：栗山村田代山林道（滝沢・佐藤，1998）。

230. ムラサキアシナガトビハムシ *Longitarsus boraginicolus* Ohno

平地～低山地のヒレハリソウに多い。

採集データ：那須町豊原甲，3-V-1994，11exs.，稲泉。宇都宮市峰町，5-V-1973，6exs.，稲泉。西方町真名子，27-VII-1998，9exs.，稲泉他。

文献記録：日光市東小来川（稲泉，1986 c）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。小山市出井（滝沢・小池，1998）。

231. カクムネアシナガトビハムシ *Longitarsus quadraticollis* Jacoby

ムラサキシキブで見られるが，発見例はあまり多くない。

採集データ：那須町寺子内，5-VII-1997，1ex.，佐藤。

葛生町豊代, 18-VI-1997, 3exs., 佐藤他.

文献記録: 那須町湯本 (大野, 1964). 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990 c). 鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉, 1994).

232. ヨモギトビハムシ *Longitarsus succineus* (Foudras)

平地～山地のヨモギで見られる。

採集データ: 那須町稲沢, 14-X-1994, 1ex., 香川. 栗山村湯西川, 28-IX-1982, 1ex., 川上. 塩谷町船生, 11-IX-1996, 6 exs., 稲泉. 宇都宮市石井町, 24-VII-1984, 3 exs., 稲泉他.

文献記録: 藤原町横川 (滝沢・佐藤, 1998). 矢板市泉 (加藤, 1970). 日光市湯元 (稲泉, 1986 c). 鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉, 1988). 足利市渡良瀬川 (大川, 1990) 他.

233. オオアシナガトビハムシ *Longitarsus nitidus* Jacoby

平地～低山地に広く分布する。

採集データ: 黒磯市塩那スカイライン, 1-VIII-1994, 1ex., 阿部. 宇都宮市宿郷町, 26-VII-1997, 1ex., 松原. 田沼町下彦間, 20-VI-1998, 8 exs., 稲泉他.

文献記録: 那須町高久・小深堀 (佐藤ら, 1994). 藤原町上三依 (稲泉, 1985 a). 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990 c). 宇都宮市徳次郎 (稲泉・福田, 1972). 小山市渡良瀬遊水池 (大川, 1997) 他.

234. ハッカアシナガトビハムシ *Longitarsus nipponensis* Csiki

現在までの県内記録は次の4地点である。

採集データ: 小山市下生井・渡良瀬遊水池, 13-IV-1997, 9 exs., 佐藤.

文献記録: 栗山村川俣 (滝沢・佐藤, 1998). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 藤岡町渡良瀬遊水池 (大川, 1997).

235. ヒヨドリバナアシナガトビハムシ *Longitarsus nitidiamiculus* Kimoto

県内では下記も含め6地点から記録されている。

採集データ: 那須町豊原乙, 15-VI-1997, 2 exs., 佐藤. 塩谷町佐貫, 29-IV-1996, 1ex., 稲泉. 田沼町下彦間, 20-VI-1998, 8exs., 稲泉他.

文献記録: 栗山村馬坂 (滝沢・佐藤, 1998).

236. クガイソウアシナガトビハムシ *Longitarsus longiseta* Weise

県内記録は下記の1例のみである。

文献記録: 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994).

237. トウヨウアシナガトビハムシ *Longitarsus tabidus orientalis* Jacoby

県内では渡良瀬遊水池からのみ記録がある。

採集データ: 藤岡町渡良瀬遊水池, 21-VI-1999, 2 exs., 稲泉.

文献記録: 藤岡町渡良瀬遊水池, 小山市渡良瀬遊水池 (大川, 1997).

238. スズキアシナガトビハムシ *Longitarsus suzukii* Ohno

本種の記録も下記から知られるのみである。

採集データ: 栃木市柏倉町, 18-VIII-1991, 1ex., 吉富, 28-VIII-1991, 1ex., 吉富.

239. ヒゲナガルリマルノミハムシ *Hemipyxis plagioderoides* (Motschulsky)

低山地～山地で種々の葉上に多い。

採集データ: 那須町北湯, 1-VII-1973, 3 exs., 田中 (正). 矢板市長井, 10-VI-1993, 3 exs., 稲泉. 日光市霧降, 15-VI-1958, 13 exs., 稲泉. 真岡市下籠谷, 31-V-1993, 1ex., 稲泉. 田沼町作原, 20-VI-1998, 2 exs., 香川他.

文献記録: 黒羽町八溝山 (稲泉, 1990 c). 栗山村野門 (稲泉ら, 1990). 今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995). 足尾町銀山平 (稲泉, 1994). 足利市名草上町 (大川, 1990) 他.

240. キバネマルノミハムシ *Hemipyxis flavipennis* (Baly)

低山地を中心にネズミモチに見られる。

採集データ: 黒磯市百村・矢沢, 21-VI-1979, 1ex., 稲泉. 塩原町新湯, 21-VI-1959, 2 exs., 稲泉. 塩谷町佐貫, 29-VI-1996, 1ex., 稲泉. 烏山町横枕, 18-V-1997, 1ex., 稲泉. 佐野市唐沢山, 8-VI-1998, 15 exs., 稲泉 (尾根すじに自生するネズミモチに夥しく発生) 他.

文献記録: 黒羽町八溝山 (稲泉, 1990 c). 藤原町中三依 (滝沢・佐藤, 1998). 日光市裏見の滝 (稲泉, 1986 c). 宇都宮市長岡湿地 (佐藤, 1996). 足利市織姫山 (大川, 1990) 他.

241. テントウノミハムシ *Argopistes biplagiatus* Motschulsky

平地～低山地でアオダモ, イボタなどに見られるが, あまり多くない。

採集データ: 粟野町勝雲寺, 18-V-1997, 1ex., 佐藤.

文献記録: 黒羽町八溝山 (稲泉, 1990 c). 栗山村田代山林道 (滝沢・佐藤, 1998). 宇都宮市下荒針・寺内溜 (稲泉・佐藤, 1996). 足利市小俣岩切 (大川, 1990) 他.

242. ヘリグロテントウノミハムシ *Argopistes coccinelliformis* Csiki

市街地のキンモクセイやヒイラギなどに大発生し, 大きな被害を与えている。

採集データ：宇都宮市東峰町，9-VII-1985，3 exs.，稲泉。茂木町十石，20-VII-1974，16 exs.，田中（正）。佐野市富士町，8-VI-1998，16 exs.，稲泉他。

文献記録：鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。宇都宮市睦町（園部，1997）。小山市出井（滝沢・小池，1998）他。

243. オオアカマルノミハムシ *Argopus clypeatus* Baly
平地及び丘陵地のセンニンソウに多く見られる。

採集データ：茂木町鎌倉山，24-IV-1997，2 exs.，稲泉。烏山町横枕，18-V-1997，4 exs.，稲泉。市貝町笹原田，24-IV-1997，3 exs.，稲泉。宇都宮市柳田緑地，10-V-1997，5 exs.，稲泉他。

文献記録：宇都宮市下荒針・七久保溜（稲泉・佐藤，1996）。

244. オオキイロマルノミハムシ *Argopus balyi* Harold
平地～山地にかけてボタンズルに多い。

採集データ：黒磯市百村・矢沢，16-VII-1979，1 ex.，平良。栗山村湯西川，8-VII-1982，2 exs.，稲泉。馬頭町鷺子山，14-IX-1969，3 exs.，稲泉。益子町雨巻山，18-VI-1961，1 ex.，樋口。田沼町飛駒，20-VI-1998，5 exs.，稲泉他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）。塩原町大沼（稲泉，1987）。日光市西小来川（稲泉，1986 c）。宇都宮市長岡湿地（稲泉・佐藤1996）。足利市名草（稲泉，1989 c）他。

245. ウスイロマルノミハムシ *Argopus unicolor* Motschulsky

記録されたのは次の3地点である。

採集データ：足利市迫間湿地，17-IV-1999，5 exs.，稲泉（センニンソウより得た）。

文献記録：鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。足利市榊崎入谷（大川，1990）他。

246. アカイロマルノミハムシ *Argopus punctipennis* (Motschulsky)

平地～山地にかけてアザミ類で見られる。

採集データ：黒磯市百村・大川林道，22-VI-1979，1 ex.，稲泉。栗山村鬼怒沼，19-VII-1969，1 ex.，稲泉。日光市小田代ヶ原，24-VI-1963，1 ex.，関口。烏山町横枕，18-V-1997，2 exs.，香川。葛生町柿平，29-IV-1998，2 exs.，稲泉他。

文献記録：那須町湯本（大野，1964）。藤原町上三依（稲泉，1985 a）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。宇都宮市長岡湿地（佐藤，1996）。小山市出井（滝沢・小池，1998）他。

247. シリアカタマノミハムシ *Sphaeroderma nigricolle* Jacoby

関東部の八溝山系から記録され，サルトリイバラやタチソオデなどに見られる。

採集データ：黒羽町両郷，4-VI-1994，1 ex.，稲泉。烏山町松倉山，30-VII-1997，2 exs.，稲泉。

文献記録：黒羽町八溝山，益子町雨巻山（稲泉，1983 b）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。

248. ヌカキビタマトビハムシ *Sphaeroderma seriatum* Baly

平地～低山地でヌカキビにつく。

採集データ：塩谷町船生，11-IX-1996，1 ex.，稲泉。市貝町笹原田，30-VII-1997，2 exs.，香川他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）。黒磯市下黒磯（佐藤・大川，1998）。大田原市佐久山（加藤，1970）。宇都宮市鶴田沼（佐藤ら，1992）。小山市出井（滝沢・小池，1998）他。

249. ヒメアオタマノミハムシ *Sphaeroderma separatum* Baly

低山地から広く見つかっているが，あまり多くない。

採集データ：茂木町飯，18-VI-1997，1 ex.，香川。田沼町黒沢，21-VI-1998，5 exs.，稲泉他。

文献記録：黒磯市百村・大川林道（佐藤・大川，1998）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。足利市名草大坂（大川，1990）他。

250. キイロタマノミハムシ *Sphaeroderma unicolor* Kimoto

平地～低山地のセンニンソウで見られる。

採集データ：鹿沼市上南摩，1-VII-1992，3 exs.，稲泉。益子町高館山，23-VIII-1997，1 ex.，稲泉。田沼町飛駒，20-VI-1998，2 exs.，稲泉他。

文献記録：那須町湯本（大野，1964）。藤原町上三依（稲泉，1985 a）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。宇都宮市七久保溜（稲泉・佐藤，1996）。足利市多田木山（大川，1990）他。

251. アケビタマノミハムシ *Sphaeroderma akebiae* Ohno

平地～山地帯のアケビ類で見られる。

採集データ：那須町大島，19-IX-1994，2 exs.，稲泉。塩谷町佐貫，22-VI-1958，1 ex.，稲泉。茂木町飯，18-VI-1997，1 ex.，稲泉。田沼町長谷場，21-V-1998，2 exs.，稲泉他。

文献記録：黒磯市三斗小屋～大峠（加藤，1970）。栗山村土呂部（稲泉ら，1990）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉ら，1988）。藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

252. ムネアカタマノミハムシ *Sphaeroderma placidum* Harold

低山地のボタンズルに多い。

採集データ：那須町大和須，4-VI-1994，1ex.，香川。塩原町大沼，7-VI-1995，1ex.，稲泉。日光市小倉山，12-VII-1983，8 exs.，稲泉。茂木町木幡，18-VI-1997，4 exs.，稲泉。田沼町黒沢，21-VI-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：黒磯市赤坂（佐藤・大川，1998）。栗山村青柳平（稲泉ら，1990）。馬頭町鷺子山（加藤，1970）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）。野木町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

253. ヒゲナガタマノミハムシ *Sphaeroderma japonum* Baly

平地～低山地で見られるが，あまり多くない。

採集データ：上河内町羽黒山，26-VI-1997，1ex.，香川。宇都宮市峰町，1-VI-1985，3 exs.，高橋（滋）（ツククサより）。西方町真名子，27-VII-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。田沼町作原（佐藤ら，1998）他。

254. クロバタマノミハムシ *Sphaeroderma balyi* Jacoby

これまでの記録は下記の3地点から知られるのみである。

文献記録：栗山村川俣・馬坂沢，同土呂部（滝沢・佐藤，1998）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。

255. ツマキタマノミハムシ *Sphaeroderma apicale* Baly

平地～低山地のススキに多い。

採集データ：矢板市長井，1-VI-1988，1ex.，稲泉。大田原市佐久山，20-VIII-1970，2 exs.，稲泉。烏山町滝，18-V-1997，1ex.，稲泉。栃木市太平山，19-IX-1998，1ex.，稲泉他。

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）。藤原町上三依（稲泉，1985 a）。日光市霧降（稲泉，1970 c）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）。小山市島田（吉富，1994）他。

256. ヒロアシタマノミハムシ *Sphaeroderma tarsatum* Baly

ササ類につき，平地でも見られるところがあるが，分布の中心は1000m付近と思われる。

採集データ：黒磯市三斗小屋，29-VII-1969，1ex.，稲泉。日光市湯元，11-VIII-1970，6 exs.，稲泉。上河内町羽黒山，26-VI-1997，15 exs.，稲泉。田沼町下彦間，20-VI-1998，7 exs.，稲泉他。

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990 c）。栗山村湯西川（滝沢・佐藤，1998）。今市市木和田島・弁天沼

（稲泉ら，1995）。粟野町横根山（稲泉ら，1988）。宇都宮市長岡湿地（佐藤，1996）他。

257. トホシマルトビハムシ *Schenklingia kasuga* Nakane

県内記録は次の1例のみである。

文献記録：塩谷町尚仁沢上流部（佐藤ら，1998）。

258. セマルトビハムシ *Minota nigropicea* (Baly)

低山地のシダ類につく。記録の大部分は県南部からのものである。

採集データ：鹿沼市石裂山，28-V-1997，2 exs.，稲泉。葛生町秋山，29-IV-1998，9 exs.，稲泉。田沼町白岩，27-V-1998，2 exs.，稲泉他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）。足利市名草夏畑（大川，1990）。

259. ヤハズトビハムシ *Dibolia japonica* Chen

湿地や水辺から見つかっているが少ない。

採集データ：日光市戦場ヶ原，6-VIII-1996，1ex.，根本。文献記録：塩谷町船生・鬼怒川（佐藤ら，1998）。藤岡町渡良瀬遊水池（佐藤・大桃，1997；佐藤ら，1998）。

260. タマアシトビハムシ *Philopona vibex* (Erichson)

平地～山地にかけてオオバコに多い。

採集データ：塩原町和田山，18-V-1995，1ex.，稲泉。喜連川町上河戸，30-V-1988，2 exs.，稲泉。烏山町小木須，29-VII-1997，6 exs.，稲泉。田沼町作原，20-VI-1998，3 exs.，香川他。

文献記録：那須町湯本（大野，1964）。藤原町横川（稲泉，1991 c）。栗山村上栗山（稲泉ら，1990）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。南那須町鴻野山（稲泉，1991 b）。足利市迫間湿地（稲泉，1989 c）他。

261. トラノオトビハムシ *Lythrararia salicariae* (Paykull)

県内では下記の4カ所から記録されている。

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。宇都宮市駒生湿地（稲泉・佐藤，1996）。藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）。

262. カクムネチビトビハムシ *Neocrepidodera recticollis* (Jacoby)

これまでの県内記録は下記の4例である。

採集データ：塩谷町船生・百目鬼，11-IX-1996，2 exs.，稲泉。

文献記録：藤原町上三依（稲泉，1985 a）。鹿沼市古峰ヶ原（稲泉，1994）。足利市大岩山（大川，1990）。

263. クサレダマチビトビハムシ *Neocrepidodera sibirica* (Pic)

県央～北部の湿地などで得られているが，記録例は少ない。

採集データ：今市市小休戸，19-VII-1996，10 exs.，稲泉。

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）。藤原町横川，栗山村日陰（滝沢・佐藤，1998）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。宇都宮市駒生湿地（稲泉・佐藤，1996）他。

264. ミドリトビハムシ *Crepidodera japonica* Baly
平地～山地にかけてヤナギ類に多い。

採集データ：那須町峰ノ茶屋，25-V-1996，4 exs.，稲泉。栗山村湯西川，13-V-1981，3 exs.，新田。日光市西の湖，16-VI-1982，2 exs.，稲泉他。

文献記録：黒磯市三斗小屋（稲泉，1990 a）。矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）。日光市霧降（福田，1971 b）。足尾町唐風呂沢（稲泉，1994）。栃木市柳原町（吉富，1994；冬季にケヤキ樹皮下より）。藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）他。

265. オオキイロノミハムシ *Asiolestia obscuritarsis* (Motschulsky)

山地帯でアザミ類に見られる。

採集データ：黒磯市百村・大巻川，5-VII-1994，1 ex.，香川。塩原町元湯，25-VII-1971，1 ex.，稲泉。日光市小田代ヶ原，7-VIII-1996，1 ex.，廣永。田沼町熊鷹山，8-VIII-1998，1 ex.，香川他。

文献記録：黒羽町八溝山（加藤，1970）。藤原町上三依（稲泉，1985 a）。栗山村湯西川（滝沢・佐藤，1998）。日光市霧降（倉茂ら，1965；灯火飛来）。栗野町横根山（稲泉，1988）他。

266. カクムネトビハムシ *Asiolestia laevicollis* (Jacoby)

Jacoby (1885 b) が Nikko からの標本により新種記載した種であり，同時に記載された *Crepidodera acuminata* は本種のシノニムとされる。平地～低山地に分布する。

採集データ：栗山村湯西川，23-VII-1982，2 exs.，稲泉。日光市西小来川，23-VIII-1983，2 exs.，稲泉他。

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990 c）。矢板市尚仁沢（稲泉ら，1993；稲泉・香川，1993）。宇都宮市柳田緑地（稲泉，1982 a）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。足利市渡良瀬川（大川，1990）他。

267. セダカクムネトビハムシ *Asiolestia gruevi* Kimoto

平地～山地にかけて得られているが，記録の大部分は県北西部の山地帯からのものである。

採集データ：那須岳，1-VIII-1993，2 exs.，中村。藤原町鶏頂山，11-VII-1995，1 ex.，稲泉。塩谷町船生，

11-IX-1996，9 exs.，稲泉。日光市瀬沼，7-VIII-1996，2 exs.，田中（隆）他。

文献記録：黒磯市百村・大川林道（稲泉，1989 a）。栗山村日光沢（稲泉・香川，1992）。足利市渡良瀬川（大川，1990）他。

268. サンゲトビハムシ *Lipromima minuta* (Jacoby)
低山地から広く記録されているが，あまり多くない。

採集データ：那須町豊原乙・常民夕狩，15-VI-1997，1 ex.，佐藤。茂木町飯，18-VI-1997，1 ex.，稲泉。岩舟町岩舟山，19-IV-1995，1 ex.，山岸他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）。矢板市尚仁沢（稲泉，1993；稲泉・香川，1993）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）。馬頭町鷺子山（稲泉，1990 c）。足利市名草大坂（大川，1990）他。

269. アラメクビボソトビハムシ *Pseudoliprus nigritus* (Baly)

低山地～山地帯のヤマブドウなどに多い。

採集データ：黒磯市百村・大巻川，5-VII-1994，9 exs.，稲泉。藤原町上三依，28-VII-1991，2 exs.，稲泉。足尾町庚申山，27-VII-1992，3 exs.，稲泉。田沼町黒沢，21-VI-1998，4 exs.，稲泉他。

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990 c）。栗山村馬坂（滝沢・佐藤，1998）。鹿沼市上南摩（滝沢，1994）他。

270. クビボソトビハムシ *Pseudoliprus hirtus* (Baly)
山地帯でヤマブドウなどに見られる。

採集データ：栗山村湯西川，6-VII-1982，4 exs.，稲泉。藤原町鶏頂山，11-VII-1995，1 ex.，稲泉。

文献記録：黒磯市百村・大川林道（佐藤・大川，1998）。藤原町上三依（稲泉，1991 c）。日光市西の湖（稲泉，1986 c）他。

271. セズクビボソトビハムシ *Pseudoliprus suturalis* (Jacoby)

低山地～山地でヤマブドウなどにつく。北部山地では本属の3種が混棲する。

採集データ：栗山村湯西川，30-VI-1981，2 exs.，稲泉。今市市小休戸，19-VII-1996，1 ex.，香川。田沼町黒沢，21-VI-1998，3 exs.，稲泉他。

文献記録：藤原町横川（滝沢・佐藤，1998）。黒磯市百村・小蛇尾川上流（佐藤・大川，1998）。

272. オオヒサゴトビハムシ *Chaetocnema major manchurica* Heikertinger

下記から9月末（1991）に1匹の記録がある。

文献記録：藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）。

273. オカボトビハムシ *Chaetocnema basalis* Baly
下記の湿地からの記録がある。

文献記録：塩谷町船生・天頂，藤岡町渡良瀬遊水池（佐藤・大桃，1996）．野木町渡良瀬遊水池（大川，1997）他．

274. アオバドウガネトビハムシ *Chaetocnema koreana* Chūjō

平地～山地で得られているが，あまり多くない．

採集データ：日光市逆川，5-VIII-1996，1ex.，廣永．今市市小休戸，19-VII-1996，11 exs.，稲泉．宇都宮市柳田緑地，10-V-1997，1ex.，稲泉．

文献記録：藤原町横川，栗山村日光沢（滝沢・佐藤，1998）．黒磯市高林（佐藤・大川，1998）．小山市渡良瀬遊水池（大川，1997）他．

275. フタイロヒサゴトビハムシ *Chaetocnema bicolorata* Kimoto

平地～低山地の湿地や水辺に見られる．

採集データ：黒羽町八溝山，27-V-1983，4 exs.，稲泉．塩原町墓沼，13-IX-1995，1ex.，稲泉．塩谷町船生，11-IX-1996，2 exs.，稲泉．真岡市下籠谷，25-V-1984，4 exs.，稲泉．小山市渡良瀬遊水池，13-IV-1997，16 exs.，佐藤他．

文献記録：栗山村川俣（滝沢・佐藤，1998）．鹿沼市上南摩（滝沢，1994）．藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）他．

276. テンサイトビハムシ *Chaetocnema concinna* (Marsham)

平地～山地の湿地や草場で見られる．

採集データ：藤原町鶏頂山，11-VII-1995，1ex.，稲泉．日光市湯元，9-VII-1970，1ex.，稲泉．烏山町松倉山，30-VII-1997，8 exs.，稲泉（サナエタデより得た）．大平町，11-VI-1990，8 exs.，園部（ギンギンより得た）他．

文献記録：那須町高久・小深堀（佐藤ら，1994）．栗山村土呂部（滝沢・佐藤，1998）．宇都宮市上篠井湿地（稲泉・佐藤，1996）．小山市出井（滝沢・小池，1998）他．

277. ケイチゴトビハムシ *Chaetocnema discreta* (Baly)

平地～低山地のイチゴ類で見られる．

採集データ：上河内町羽黒山，26-VI-1997，1ex.，香川．宇都宮市西川田，8-VI-1990，9 exs.，園部（ナワシロイチゴより得た）．栃木市出流町，16-V-1998，33 exs.，稲泉他．

文献記録：那須町湯本（大野，1964）．藤原町中三依（滝沢・佐藤，1998）．鹿沼市上南摩（滝沢，1994）．

278. ムギヒサゴトビハムシ *Chaetocnema cylindrica* Baly

県内記録は次の2湿地から知られるのみである．

文献記録：塩谷町船生・天頂（佐藤・大桃，1996）．

藤岡町渡良瀬遊水池（大川，1997）．

279. ヒサゴトビハムシ *Chaetocnema ingenua* (Baly)

平地～山地の草地に多い．

採集データ：日光市志津，5-VIII-1996，1ex.，香川．宇都宮市峰町，1-XII-1994，1ex.，稲泉．栃木市太平山，19-IX-1998，1ex.，稲泉他．

文献記録：大田原市蛇尾川河原（加藤，1970）．鹿沼市上南摩（滝沢，1994）．真岡市下高間木（稲泉ら，1997；冬季に雑木林の落葉下より得た）他．

280. ヒメドウガネトビハムシ *Chaetocnema concin-nicollis* (Baly)

平地～山地の草地に多い．

採集データ：日光市菖蒲，6-VIII-1996，4exs.，稲泉．茂木町鎌倉山，24-IV-1997，2exs.，香川．田沼町飛駒，20-VI-1998，1ex.，稲泉他．

文献記録：藤原町横川（稲泉，1991 c）．藤原町中三依（滝沢・佐藤，1998）．大田原市佐久山（加藤，1970）．宇都宮市駒生湿地（稲泉・佐藤，1996）．上三川町五分一（稲泉ら，1997；冬季に雑木林の落葉下より得た）他．

281. ナトビハムシ *Psylliodes punctifrons* Baly

平地～山地のアブラナ科植物に多い．

採集データ：鹿沼市岩山，15-V-1970，2 exs.，稲泉．佐野市唐沢山，8-VI-1998，1ex.，稲泉．烏山町小木須，28-VII-1997，1ex.，松原他．

文献記録：黒磯市板室（佐藤・大川，1998）．日光市竜頭（稲泉，1983 b）．宇都宮市鶴田沼（佐藤ら，1992）．足利市常見町（大川，1990）他．

282. チュウジョウナガスネトビハムシ *Psylliodes chujoe* Mader

低山地～山地帯で得られているが，記録数はあまり多くない．

採集データ：烏山町小木須，29-VII-1997，1ex.，石川．田沼町白岩，27-V-1998，1ex.，稲泉他．

文献記録：栗山村八丁の湯（稲泉ら，1990）．栗山村土呂部（滝沢・佐藤，1998）．日光市竜頭（稲泉，1986 c）．鹿沼市上南摩（滝沢，1994）他．

283. ダイコンナガスネトビハムシ *Psylliodes subrugosa* Jacoby

平地～山地にかけてアブラナ科植物に多い．

採集データ：黒磯市百村・大川林道，1-VIII-1994，1ex.，川田．塩原町和田山，18-V-1995，1ex.，稲泉．日光市男体山，6-VIII-1996，1ex.，太田．鹿沼市北犬飼，30-V-1968，2 exs.，斉藤（浩）．葛生町秋山，29-IV-1998，3 exs.，稲泉他．

文献記録：黒羽町八溝山（稲泉，1990 c）．矢板市尚

仁沢 (稲泉ら, 1993; 稲泉・香川, 1993). 大田原市福原 (加藤, 1970). 宇都宮市柳田緑地 (稲泉・佐藤, 1996). 野木町渡良瀬遊水池 (大川, 1997) 他.

284. ルリナガスネトビハムシ *Psylliodes bretinghami* Baly

今のところ, 県内記録は次の3例のみである。

文献記録: 黒磯市寺子 (佐藤・大川, 1998). 足利市渡良瀬川, 同樺崎堤谷 (大川, 1990).

285. アサトビハムシ *Psylliodes attenuata* (Koch)

平地～低山地のカナムグラに多い。

採集データ: 那須町豊原甲, 3-V-1994, 3 exs., 稲泉. 馬頭町鷺子山, 27-IV-1983, 6 exs., 稲泉. 烏山町滝, 18-V-1997, 4 exs., 稲泉. 宇都宮市峰町, 14-IV-1988, 13 exs., 稲泉. 西方町真名子, 27-VII-1998, 6 exs., 香川他.

文献記録: 藤原町上三依 (稲泉, 1991 c). 栗山村上栗山 (稲泉ら, 1990). 粟野町横根山 (稲泉ら, 1988). 今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995). 足利市名草 (稲泉, 1989 c) 他.

286. ナスナガスネトビハムシ *Psylliodes angusticollis* Baly

平地～山地のジャガイモ, ナスにつき害虫となる。

採集データ: 黒羽町須佐木, 14-X-1994, 6 exs., 稲泉. 栗山村湯西川, 1-VII-1981, 1 ex., 稲泉. 日光市東小来川, 5-VIII-1983, 2 exs., 稲泉. 宇都宮市峰町, 28-X-1954, 1 ex., 田中 (正). 栃木市出流町, 16-V-1998, 1 ex., 香川他.

文献記録: 藤原町横川 (滝沢・佐藤, 1998). 大田原市佐久山 (加藤, 1970). 南那須町鴻野山 (稲泉, 1991 b). 足利市名草 (稲泉, 1989 c) 他.

287. ルリマルノミハムシ *Nonarthra cyanea* Baly

平地～山地の各種花上に多い。

採集データ: 那須町豊原甲, 3-V-1994, 4 exs., 稲泉. 塩原町大沼, 5-VI-1993, 1 ex., 稲泉. 日光市霧降, 15-VI-1958, 1 ex., 稲泉. 宇都宮市古賀志山, 29-IV-1970, 1 ex., 稲泉. 田沼町下彦間, 20-VI-1998, 2 exs., 稲泉他.

文献記録: 黒羽町上南方 (稲泉, 1990 c). 藤原町上三依 (稲泉, 1985 a). 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990 c). 足尾町庚申山 (稲泉, 1994). 栃木市太平山 (吉富, 1996) 他.

288. コマルノミハムシ *Nonarthra tibialis* Jacoby

本種は, Jacoby (1885 b) が Nikko 他から得られた標本により新種として記載したものである。平地で種々の花上より前種に混じって得られるが, 個体数は多くない。

採集データ: 宇都宮市峰町, 16-V-1958, 1 ex., 稲泉.

田沼町長谷場, 27-V-1998, 1 ex., 稲泉.

文献記録: 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 小山市城山公園 (吉富, 1994; 冬季にケヤキ樹皮下より得た). 足利市名草大坂 (大川, 1990) 他.

トゲハムシ亜科 Hispinae

289. カタピロトゲトゲ *Dactylispa subquadrata* (Baly)

平地～低山地のクリ, クヌギなどで見られる。

採集データ: 那須町両郷, 4-VI-1994, 2 exs., 稲泉. 塩谷町佐貫, 29-VI-1996, 1 ex., 稲泉. 宇都宮市長岡町, 5-VI-1988, 2 exs., 熊沢. 葛生町秋山, 29-IV-1998, 1 ex., 香川他.

文献記録: 黒磯市杉渡土 (佐藤・大川, 1998). 今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995). 益子町高館山 (稲泉, 1990 c). 栃木市梓町 (吉富, 1990; エノキの落葉下で越冬中) 他.

290. ヒメキベリトゲトゲ *Dactylispa angulosa* (Solsky)

平地～山地にかけて広く分布する。

採集データ: 日光市田母沢, 22-V-1988, 1 ex., 稲泉. 市貝町多田羅沼, 19-V-1989, 2 exs., 高橋 (滋). 葛生町柿平, 29-IV-1998, 1 ex., 稲泉他.

文献記録: 那須町湯本 (大野, 1964). 栗山村土呂部 (稲泉ら, 1990). 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990 c). 鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉, 1994). 足利市小俣岩切 (大川, 1990) 他.

291. キベリトゲトゲ *Dactylispa masonii* Gestro

平地～山地のアザミ類に多く見られる。

採集データ: 塩原町新湯, 25-VI-1969, 1 ex., 稲泉. 日光市東小来川, 10-V-1983, 2 exs., 稲泉. 烏山町滝, 18-V-1997, 1 ex., 稲泉. 葛生町秋山, 29-IV-1998, 1 ex., 香川他.

文献記録: 那須町高久・小深堀 (佐藤ら, 1994). 矢板市尚仁沢 (稲泉ら, 1993; 稲泉・香川, 1993). 大田原市藤沢 (加藤, 1970). 鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉, 1994). 小山市出井 (滝沢・小池, 1998) 他.

292. クロトゲハムシ *Hispellinus moerens* (Baly)

河川沿いのススキに多く見られる。

採集データ: 那須町豊原乙・常民夕狩, 15-VI-1997, 2 exs., 佐藤. 氏家町上阿久津・鬼怒川, 10-VI-1999, 6 exs., 稲泉. 宇都宮市柳田・鬼怒川, 18-VIII-1997, 1 ex., 佐藤他.

文献記録: 大田原市今泉・蛇尾川 (佐藤・大桃, 1997). 黒磯市島方・蛇尾川 (佐藤・大川, 1998).

293. クロルリトゲトゲ *Rhadinosa nigrocyanea* Motschulsky

低山地～山地帯のススキに見られる。

採集データ：栗山村湯西川, 8-VII-1982, 2 exs., 稲泉. 今市市小休戸, 19-VII-1996, 2 exs., 香川. 鹿沼市古峰ヶ原, 7-VII-1963, 1 ex., 齊藤 (浩) 他.

文献記録：黒羽町八溝山 (稲泉, 1990 c). 黒磯市湯宮 (佐藤・大川, 1998). 塩原町元湯 (稲泉ら, 1987). 日光市東小来川 (稲泉, 1986 c). 足尾町今倉沢 (稲泉, 1994). 足利市松田川上流 (大川, 1990) 他.

294. タグチホソヒラタハムシ *Leptispa taguchii* Chūjō

平地の湿地などのススキから得られているが, 少ない。

文献記録：那須町豊原乙・常民夕狩, 小山市出井 (滝沢・小池, 1998). 黒磯市寺子・富士見峠 (佐藤・大川, 1998). 塩谷町佐貫・鬼怒川 (佐藤・大桃, 1994). 宇都宮市駒生湿地 (稲泉・佐藤, 1996). 益子町八幡池 (佐藤・大桃, 1997). 足利市松田町 (大川, 1988) 他.

カメノコハムシ亜科 Cassidinae

295. ジンガサハムシ *Aspidomorpha indica* Boheman

平地～低山地のヒルガオで見られる。

採集データ：栗山村湯西川, 29-VII-1981, 1 ex., 江尻. 喜連川町上河戸, 6-VIII-1988, 2 exs., 稲泉. 宇都宮市峰町, 6-V-1982, 1 ex., 高橋 (滋). 田沼町栃本, 20-VI-1998, 1 ex., 小畑他.

文献記録：那須町伊王野 (稲泉, 1990 c). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 足利市迫間湿地 (大川, 1990) 他.

296. スキバジンガサハムシ *Aspidomorpha transparipennis* Motschulsky

平地～低山地で記録されているが, 多くない。

文献記録：日光市小倉山 (稲泉, 1986c). 宇都宮市古賀志山 (稲泉, 1969). 益子町雨巻山 (稲泉, 1990 c). 鹿沼市上南摩 (滝沢, 1994). 小山市出井 (滝沢・小池, 1998). 藤岡町渡良瀬遊水池 (大川, 1990).

297. クロマダラカメノコハムシ *Glyphocassis spilota* (Gorham)

Gorham (1885) が野木町渡良瀬遊水池付近の Nowata (野渡) より得られた個体により, 新種として記載した種である。その後, 県内からの記録はない。

298. カメノコハムシ *Cassida nebulosa* Linnaeus

高標高地からも得られているが, 平地のアカザ, シロザに多い。

採集データ：黒磯市小佐飛, 30-VII-1972, 5 exs., 稲泉. 栗山村湯西川, 8-VII-1982, 1 ex., 菊地. 今市市小休戸, 19-VII-1996, 1 ex., 稲泉. 芳賀町和泉, 21-V-

1973, 22 exs., 稲泉他.

文献記録：那須町高久・小深堀 (佐藤ら, 1994). 藤原町上三依 (稲泉, 1985 a). 日光市湯元 (稲泉, 1986 c). 宇都宮市砂田町 (稲泉ら, 1997; 冬季に雑木林の落葉下より得た). 足利市常見町 (大川, 1990) 他.

299. ヒメジンガサハムシ *Cassida fuscorufa* Motschulsky

平地～山地のヨモギ類に多い。

採集データ：那須町南月山, 2-VIII-1994 2 exs., 川田. 塩原町ヨシ沼, 7-VI-1995, 1 ex., 稲泉. 今市市千本木, 1-VII-1992, 1 ex., 稲泉. 茂木町鮎田, 1-VI-1997, 1 ex., 小林. 葛生町柿平, 29-IV-1998, 2 exs., 稲泉他.

文献記録：黒羽町八溝山 (稲泉, 1990 c). 栗山村野門 (稲泉ら, 1990). 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990 c). 宇都宮市滝の原 (園部, 1996). 小山市渡良瀬遊水池 (大川, 1997) 他.

300. イノコズチカメノコハムシ *Cassida japona* Baly

県内からの確かな記録は下記の1例にすぎないが, 次種の記録の中に本種が含まれている可能性が大きい。

文献記録：小山市出井 (滝沢・小池, 1998).

301. ヒメカメノコハムシ *Cassida piperata* Hope

平地～低山地のイノコズチに多い。

採集データ：那須町大和須, 4-VI-1994, 3 exs., 稲泉. 塩原町和田山, 18-V-1995, 1 ex., 香川. 日光市田母沢, 11-VI-1982, 7 exs., 稲泉. 鹿沼市石裂山, 28-VIII-1966, 1 ex., 大兼. 佐野市唐沢山, 8-VI-1998, 3 exs., 稲泉他.

文献記録：黒磯市鍋掛 (佐藤・大川, 1998). 栗山村上栗山 (稲泉, 1990). 今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995). 宇都宮市駒生湿地 (稲泉・佐藤, 1996). 上三川町三村 (稲泉ら, 1997; 冬季に雑木林の落葉下より得た). 大平町下皆川 (吉富, 1994; 冬季にケヤキ樹皮下より得た) 他.

302. チャイロカメノコハムシ *Cassida nobilis* Linnaeus

足利市から3例7匹の記録がある。

文献記録：足利市迫間, 同常見町 (草野, 1988). 足利市迫間湿地 (大川, 1990).

303. ミドリカメノコハムシ *Cassida erudita* Baly

平地～山地のキバナアキギリ, ヤマハッカなどで見られる。

採集データ：栗山村湯西川, 1-VII-1981, 2 exs., 稲泉. 塩谷町船生, 11-IX-1996, 1 ex., 稲泉. 烏山町横枕, 18-V-1997, 1 ex., 稲泉他.

文献記録：黒磯市杉渡土 (佐藤・大川, 1998). 藤原町上三依 (稲泉, 1985 a). 日光市霧降 (稲泉, 1981). 宇都宮市長岡湿地 (稲泉・佐藤, 1996). 小山市思川

(滝沢・小池, 1998) 他。

304. セスジカメノコハムシ *Cassida vibex* Linnaeus
平地～山地のアザミ類で見られるが、あまり多くない。

採集データ：黒磯市塩那スカイライン, 1-VIII-1994, 1ex., 山岸。藤原町鶏頂山, 11-VII-1995, 6 exs., 稲泉。

文献記録：藤原町上三依 (稲泉, 1985 a)。宇都宮市徳次郎 (福田, 1971 a)。

305. アオカメノコハムシ *Cassida rubiginosa* Muller
低山地～山地帯のアザミ類に多い。

採集データ：黒磯市百村・大川林道, 2-VIII-1994, 2 exs., 阿部。藤原町上三依, 25-VII-1986, 3 exs., 高橋 (滋)。日光市戦場ヶ原, 16-VI-1982, 1ex., 稲泉。粟野町上粕尾, 23-IV-1961, 1ex., 稲泉。田沼町水室山, 27-V-1969, 3 exs., 稲泉他。

文献記録：那須町湯本 (大野, 1964)。栗山村日光沢 (稲泉・香川, 1992)。馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990 c)。鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉, 1994)。足利市大小山 (大川, 1990) 他。

306. セモンジンガサハムシ *Cassida versicolor*
(Boheman)

平地～低山地のサクラ類に多い。

採集データ：大田原市羽田, 8-V-1994, 1ex., 香川。塩原町臺沼, 13-IX-1995, 1ex., 稲泉。喜連川町石久保, 19-V-1997, 2 exs., 稲泉。益子町大平, 21-IX-1997, 3 exs., 稲泉。葛生町秋山, 29-IV-1998, 1ex., 香川他。

文献記録：藤原町横川, 栗山村日陰 (滝沢・佐藤, 1998)。日光市裏見の滝 (稲泉, 1986 c)。宇都宮市鶴田沼 (佐藤ら, 1992)。栃木市太平山 (吉富, 1996) 他。

307. イカリヒメジンガサハムシ *Cassida sigillata*
(Gorham) (Plate の 5)

県西部の低山地から下記の 3 例の記録がある。

文献記録：日光市中小来川 (稲泉, 1969)。粟野町上永野 (大川, 1996)。葛生町秋山 (稲泉, 1998)。

308. コガタカメノコハムシ *Cassida vespertina* Boheman

低山地のボタンズルに多い。

採集データ：那須町豊原甲, 3-V-1994, 2 exs., 稲泉。塩原町和田山, 18-V-1995, 3 exs., 稲泉。鹿沼市上南摩, 1-VII-1992, 1ex., 稲泉。今市市小林, 19-VII-1996, 1ex., 稲泉。西方町真名子, 27-VII-1998, 1ex., 稲泉他。

文献記録：黒羽町如来山 (稲泉, 1990 c)。栗山村上栗山 (稲泉ら, 1990)。宇都宮市長岡湿地 (佐藤, 1996)。日光市西小来川 (稲泉, 1986 c)。足利市深高山 (稲泉, 1989 c) 他。

309. ルイスジンガサハムシ *Thlaspidia lewisii* (Baly)
低山地～山地でコバノトネリコに多い。

採集データ：黒磯市百村・大巻川, 5-VII-1994, 1ex., 稲泉。藤原町竜王峡, 24-V-1964, 1ex., 稲泉。日光市田母沢, 7-VI-1982, 1ex., 高橋 (滋)。益子町雨巻山, 18-VI-1961, 1ex., 関口他。

文献記録：黒羽町八溝山, 馬頭町鷺子山 (稲泉, 1990 c)。栗山村八丁の湯 (稲泉ら, 1990)。粟野町横根山 (稲泉ら, 1988)。足利市西の宮 (大川, 1990) 他。

310. イチモンジカメノコハムシ *Thlaspidia cribrata*
(Boheman)

平地から山地のムラサキシキブ類に多い。

採集データ：那須町豊原甲, 3-V-1994, 3 exs., 稲泉。矢板市長井, 8-V-1982, 3 exs., 高橋 (滋)。日光市小倉山, 23-V-1971, 2 exs., 田中 (正)。宇都宮市古賀志山, 19-V-1954, 1ex., 尾田 (啓)。葛生町秋山, 29-IV-1998, 1ex., 香川他。

文献記録：黒磯市上黒磯 (佐藤・大川, 1998)。栗山村上栗山 (稲泉ら, 1990)。今市市木和田島・弁天沼 (稲泉ら, 1995)。鹿沼市古峰ヶ原 (稲泉, 1994)。小山市出井 (滝沢・小池, 1998) 他。

* 以上の他に、未同定の 5 種 (*Asiorestia* sp. 3, *Aphthona* sp. 1, *Sphaeroderma* sp. 1) が得られている。

引用文献

Chūjō, M. and Kimoto, S. (1961) Systematic catalog of Japanese Chrysomelidae (Coleoptera). *Pacific Insects*, 3 (1) : 117-202.

福田 健 (1971 a) ハムシ 2 題. *インセクト*, 22 (1) : 42.

福田 健 (1971 b) ハムシ科 2 種追加. *インセクト*, 22 (2) : 29.

福田 健 (1972) ハムシ 2 種の記録. *インセクト*, 23 (1) : 13.

福田 健 (1976 a) フキサルハムシの食草について. *インセクト*, 27 (2) : 31.

福田 健 (1976 b) ハムシ科 (鞘翅目) 追加. *インセクト*, 27 (2) : 31.

福田 健 (1981) 栃木県産ハムシ科 6 種の追加記録. *インセクト*, 32 (2) : 86.

福田 健 (1982) 栃木県産ハムシの追加記録. *インセクト*, 33 (2) : 95.

福田 健 (1988) 渡良瀬遊水池のハムシ. *インセクト*,

- 39 (1) : 33.
- Gorham, Rev. H. S. (1885) Revision of the Phytophagous Coleoptera of the Japanese fauna: Cassidinae and Hispinae. *Proc. Zool. Soc. London*, 1885, 280-286.
- 平嶋義宏監修 (1989) 日本産昆虫総目録 I. 九州大学農学部昆虫学教室・日本野生生物研究センター共編, 464-527.
- 市毛勝義 (1984) 茨城県産ハムシ科追加種. おけら, 53:39-40.
- 稲泉三丸 (1959) 那須岳採集記. *インセクト*, 10 (2) : 20-24.
- 稲泉三丸 (1961) 甲虫屋の手帳から(III). *インセクト*, 12 (2) : 16-18.
- 稲泉三丸 (1969) ハムシ数種の記録. *インセクト*, 20 (2) : 33-34.
- 稲泉三丸 (1970 a) 栃木県から記録されたハムシ. *インセクト*, 21 (1) : 12-24.
- 稲泉三丸 (1970 b) 冬季に採集したハムシ. *インセクト*, 21 (1) : 32-33.
- 稲泉三丸 (1970 c) 栃木県産ハムシ科追加. *インセクト*, 21 (2) : 25-26.
- 稲泉三丸 (1976) ツマアカアシナガトビハムシの冬季記録. *インセクト*, 27 (1) : 26.
- 稲泉三丸 (1980) 栃木県産ハムシ科(鞘翅目)の追加. *インセクト*, 31 (2) : 79.
- 稲泉三丸 (1982 a) 栃木県のハムシ科追加. *インセクト*, 33 (1) : 29, 32.
- 稲泉三丸 (1982 b) マルカメムシとウリハムシの越冬覚醒直後の集団. *インセクト*, 33 (1) : 44-45.
- 稲泉三丸 (1982 c) 栃木県産ハムシ科追加. *インセクト*, 33 (2) : 94-95.
- 稲泉三丸 (1983 a) 栃木県のハムシ科追加…208種に. *インセクト*, 34 (1) : 36.
- 稲泉三丸 (1983 b) 栃木県のハムシ科追加. *インセクト*, 34 (2) : 87-88.
- 稲泉三丸 (1984 a) 栃木県のハムシ追加. *インセクト*, 35 (1) : 22.
- 稲泉三丸 (1984 b) 栃木県から新しく見つかったハムシ. *インセクト*, 35 (2) : 61-62.
- 稲泉三丸 (1985 a) 栃木県藤原町上三依のハムシ類. *インセクト*, 36 (1) : 40-45.
- 稲泉三丸 (1985 b) 栃木県内から新しく見つかったハムシ. *インセクト*, 36 (2) : 117.
- 稲泉三丸 (1986 a) 栃木県のハムシ科追加. *インセクト*, 37 (1) : 28.
- 稲泉三丸 (1986 b) 栃木県のハムシ科覚書(1). *インセクト*, 37 (2) : 75-76.
- 稲泉三丸 (1986 c) 日光のハムシ類. 日光の動植物, 日光の動植物編集委員会編, 鹿沼: 栃の葉書房, 519-541.
- 稲泉三丸 (1987) 栃木県のハムシ科覚書(2). *インセクト*, 38 (2) : 84.
- 稲泉三丸 (1988) 栃木県のハムシ科覚書(3). *インセクト*, 39 (1) : 32-33.
- 稲泉三丸 (1989 a) 栃木県のハムシ科覚書(4). *インセクト*, 40 (1) : 47-48.
- 稲泉三丸 (1989 b) 栃木県のハムシ科覚書(5). *インセクト*, 40 (2) : 134-135.
- 稲泉三丸 (1989 c) 夏の雨の中に見た足利市のハムシ. *インセクト*, 40 (2) : 105-108.
- 稲泉三丸 (1990 a) 栃木県のハムシ科覚書(6). *インセクト*, 41 (1) : 54-55.
- 稲泉三丸 (1990 b) ヨモギハムシが飛んだ. *インセクト*, 41 (2) : 137.
- 稲泉三丸 (1990 c) 八溝山地のハムシ類. 栃木県博研報, 8 : 25-49.
- 稲泉三丸 (1991 a) 栃木県のハムシ科覚書(7). *インセクト*, 42 (1) : 30.
- 稲泉三丸 (1991 b) 栃木県のハムシ科覚書(8). *インセクト*, 42 (1) : 30-31.
- 稲泉三丸 (1991 c) 栃木県のハムシ科覚書(9). *インセクト*, 42 (2) : 69-70.
- 稲泉三丸 (1992) 栃木県のハムシ科覚書(11). *インセクト*, 43 (2) : 87.
- 稲泉三丸 (1993) 栃木県のゾウムシ類(2). *インセクト*, 44 (2) : 79-81.
- 稲泉三丸 (1994) 足尾山地のハムシ類. 栃木県博研報, 12 : 1-20.
- 稲泉三丸 (1996) 栃木県のハムシ科覚書(12). *インセクト*, 47 (1) : 15-16.
- 稲泉三丸 (1998) 栃木県のハムシ科覚書(13). *インセクト*, 49 (1) : 50-51.
- 稲泉三丸・福田 健 (1972) ハムシ科追加. *インセクト*, 23 (2) : 34-35.
- 稲泉三丸・香川清彦 (1991) 渡良瀬遊水池早春の虫. *インセクト*, 42 (2) : 70-71.
- 稲泉三丸・香川清彦 (1992) 栃木県のハムシ科覚書(10)…奥鬼怒6月末のハムシ類. *インセクト*, 43 (1) : 35-36.
- 稲泉三丸・香川清彦 (1993) 尚仁沢地域のハムシ相と年間発生消長. *インセクト*, 44 (1) : 1-3.

- 稲泉三丸・香川清彦・斉藤一三 (1993) 尚仁沢地域学術調査報告書. 栃木県林務部, 97-118.
- 稲泉三丸・加進丈二・香川清彦・田中宣幸 (1990) 栗山村の真夏の虫. *インセクト*, 41 (2) : 102-110.
- 稲泉三丸・小林隆人・香川清彦 (1997) 雑木林の落ち葉下で越冬する昆虫類. *インセクト*, 48 (1) : 13-23.
- 稲泉三丸・佐藤光一 (1996) 宇都宮市の水辺の生物 I. 甲虫類. 宇都宮市教育委員会, 73-107.
- 稲泉三丸・佐藤光一・香川清彦 (1995) 今市市弁天沼地域現況調査報告書. 栃木県林務部, 124-197.
- 稲泉三丸・高橋 滋・大森健治・村田和彦 (1988) 夏に見た横根山周辺の虫. *インセクト*, 39 (2) : 69-80.
- 稲泉三丸・高橋 滋・敦見和徳・村田和彦 (1987) 奥塩原・夏の虫. *インセクト*, 38 (2) : 66-76.
- Jacoby, M. (1885 a) Description of the Phytophagous Coleoptera of Japan, obtained by Mr. George Lewis during his second journey, from February 1880 to September 1881. Part I. *Proc. Zool. Soc. London*, 1885, 190-211.
- Jacoby, M. (1885 b) Description of the Phytophagous Coleoptera of Japan, obtained by Mr. George Lewis during his second journey, from February 1880 to September 1881. Part II. *Proc. Zool. Soc. London*, 1885, 719-755.
- 梶原敏宏・梅谷献二・浅川 勝 (1986) 作物病虫害ハンドブック. 養賢堂, 1446pp.
- 加藤 仁 (1969) ジュウシホシツツハムシの記録. *インセクト*, 20 (2) : 34-35.
- 加藤 仁 (1970) 栃木県産ハムシ科ニューレコード. *インセクト*, 21 (2) : 11-16.
- 加藤 仁 (1971) 栃木県北部産珍昆虫の発見史と現状 (その1). *インセクト*, 22 (2) : 7-8.
- 加藤 仁 (1971) 栃木県産昆虫目録, III の 2. *インセクト*, 2 (3) : 3-5.
- Kimoto, S. (1964) The Chrysomelidae of Japan and the Ryukyu Islands. I. *Jour. Fac. Agric., Kyushu Univ.*, 13 (1) : 282.
- 木元新作・森本 桂 (1984) 原色日本甲虫図鑑 (IV). 保育社, 438pp.
- 木元新作・滝澤春雄 (1994) 日本産ハムシ類幼虫・成虫分類図説. 東海大学出版会, 539pp.
- 木附嘉理 (1995) 栃木県のフトネクイハムシの記録. 月刊むし, 297:31.
- Komiya, Y. and Kubota, M. (1987) A new *Donacia* (Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae) from central Japan. *Elytra, Tokyo*. 15 (1/2) : 41-44.
- 熊沢隆義・渡辺邦夫 (1992) ケヤキでクヌギコブハムシを採る. *インセクト*, 43 (2) : 88.
- 倉茂好雄・尾田四郎・下司昌一 (1965) 日光市霧降の灯火に飛来する甲虫および蛾の種類. 宇都宮大学芸研究論集, 15 (2) : 54-67.
- 草野和重 (1988) 栃木県におけるハムシ3種の記録. *インセクト*, 39 (2) : 85-86.
- 草野智博 (1986) 藤原町上三依のジュウシホシクビナガハムシ. *インセクト*, 37 (1) : 28.
- 丸山宗利 (1998) 栃木県渡良瀬遊水池における甲虫2種の記録. 月刊むし, 332 : 41-42.
- 松原 豊 (1988) 栃木県古峰ヶ原のネクイハムシ類. *Donaciist*, 2 : 18.
- 森島啓司 (1980) 那須三斗小屋付近の昆虫. *インセクト*, 31 (2) : 43-48.
- 日本応用動物昆虫学会編 (1987) 農林有害動物・昆虫名鑑. 日本植物防疫協会, 101-104.
- 野尻湖昆虫グループ (1985) アトラス 日本のネクイハムシ. 大阪市立自然史博物館, 182pp.
- 尾田治徳 (1951) 栃木県産甲虫類分布資料(1). *インセクト*, 4 (2) : 18.
- 尾田治徳 (1956) 列車内でヨツボシフジハムシを採る. *インセクト*, 7 (2) : 5.
- 大川秀雄 (1988) タグチホシヒラタハムシの記録. *インセクト*, 39 (2) : 86.
- 大川秀雄 (1990) 足利市のハムシ科目録. *インセクト*, 41 (2) : 87-101.
- 大川秀雄 (1994) 渡良瀬川河川敷の甲虫目録とその生息場所の分類. 栃木県博研報, (12) : 35-64.
- 大川秀雄 (1996) イカリヒメジンガサハムシの採集記録. *インセクト*, 47 (1) : 41.
- 大川秀雄 (1997) 渡良瀬遊水池の動植物実態調査報告書 <昆虫編>. 渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会, 88-93.
- 大川秀雄・内山裕司 (1983) 足利市産昆虫類分布資料 (1). *インセクト*, 34 (1) : 28-30.
- 大川秀雄・草野和重 (1996) 足利市産昆虫類分布資料 (III). *インセクト*, 47 (1) : 27-28.
- Ohno, M. (1960) On the species of the genus *Altica* occurring in Japan. *Bull. Dept. Lib. Arts. Toyo Univ.*, 1, 77-98.
- 大野正男 (1964) 那須のハムシ類. *インセクト*, 15 (1) : 7-9.
- 大野正男 (1997) ブタクサハムシ (新称) 日本に侵入.

- 昆虫と自然, 32 (11) : 35.
- 大桃定洋 (1992) 栃木県北部地方の甲虫数種. 月刊むし, 257 : 36-37.
- 大桃定洋・佐藤光一 (1992) 栃木県産甲虫分布資料(1). インセクト, 43 (1) : 44-48.
- 佐藤光一 (1989 a) 栃木県産ネクイハムシ類について. 栃木県博研究紀要, 6 : 15-42.
- 佐藤光一 (1989 b) 栃木県産ネクイハムシの採集記録—1989年の新産地の記録から—. インセクト, 40 (2) : 102-104.
- 佐藤光一 (1991) 栃木県における甲虫数種の記録. インセクト, 42 (2) : 71-73.
- 佐藤光一 (1996) 宇都宮市長岡保全緑地自然環境調査報告書. 財団法人グリーントラストうつのみや, 127-130.
- 佐藤光一・加藤 仁 (1991) 栃木県産ネクイハムシの新産地の採集記録. インセクト, 42 (1) : 31-32.
- 佐藤光一・宮本竜夫・鈴木一夫 (1989) 栃木県那須町豊原乙で得られた数種の昆虫について. インセクト, 40 (1) : 19-21.
- 佐藤光一・野口達也・森島啓司 (1994) 那須町小深堀地域現況調査報告書. 栃木県林務部自然環境課, 156pp.
- 佐藤光一・大川秀雄 (1998) 黒磯市動植物実態調査報告書. 甲虫目. 黒磯市動植物実態調査研究会, 257-333.
- 佐藤光一・大川秀雄・草野和重 (1987) 栃木県におけるネクイハムシの分布について. 栃木県博研究紀要, 4 : 15-30.
- 佐藤光一・大桃定洋 (1992) 栃木県産甲虫分布資料(2). インセクト, 43 (2) : 70-76.
- 佐藤光一・大桃定洋 (1994) 栃木県産甲虫分布資料(3). インセクト, 45 (1) : 11-17.
- 佐藤光一・大桃定洋 (1995) 栃木県産甲虫分布資料(4). インセクト, 46 (1) : 14-23.
- 佐藤光一・大桃定洋 (1996) 栃木県産甲虫分布資料(5). インセクト, 47 (1) : 17-25.
- 佐藤光一・大桃定洋 (1997) 栃木県産甲虫分布資料(6). インセクト, 48 (1) : 24-34.
- 佐藤光一・大桃定洋・滝沢春雄 (1998) 栃木県産甲虫分布資料(7). インセクト, 49 (1) : 4-14.
- 佐藤光一・大桃定洋・滝澤春雄 (1999) 栃木県産甲虫分布資料 (8). インセクト, 50 : (1) : 45-54.
- 佐藤光一・鈴木一夫・中村裕之 (1992) 鶴田沼の昆虫類. 鶴田沼自然環境調査報告書, 宇都宮市, 138-203.
- 塩谷勇直 (1982) 高原山南面の興味ある昆虫. インセクト, 33 (1) : 43.
- 園部力雄 (1996) 宇都宮高校内の昆虫. インセクト, 47 (1) : 8-11.
- 園部力雄 (1997) 宇都宮市睦町の中央公園内に見られる昆虫類. 栃木県博研究紀要, 14 : 53-59.
- 園部力雄 (1998) 宇都宮市睦町の中央公園内に見られる昆虫類. 栃木県博研究紀要, 15 : 27-35.
- 滝沢春雄 (1994) 鹿沼市郊外の平地におけるハムシ相の季節的変化(昆虫綱・鞘翅目). 栃木県博研報, 12 : 21-33.
- 滝沢春雄・小池芳昭 (1998) 小山市出井のハムシ類. インセクト, 49 (1) : 24-29.
- Takizawa, H., Minami, M. and Sato, K. (1998) Notes on *Cryptocephalus luridipennis pallescens* Kraatz and *C. instabilis* Baly in Japan, with description of larvae (Coleoptera: Chrysomelidae). *Ent. Rev. Japan*, 53 (2) : 67-75.
- 滝沢春雄・佐藤光一 (1998) 栗山地域のハムシ類. 栃木県博研報, 16:15-32.
- 栃木県農務部 (1998) 平成10年度病害虫雑草防除基準. (社) 栃木県植物防疫協会, 394pp.
- 渡辺邦夫・熊沢隆義 (1993) 高館山でツバキコブハムシを採る. インセクト, 44 (1) : 45.
- 吉富博之 (1990) カタバピロトゲハムシの越冬場所. インセクト, 41 (1) : 55.
- 吉富博之 (1994) ケヤキ樹皮下で越冬する昆虫. インセクト, 45 (1) : 18-27.
- 吉富博之 (1996) 太平山の甲虫(3). インセクト, 47 (2) : 60-66.

(1999年8月31日受理)

Explanation of Plate

1. *Donacia japana* Chūjō et Goecke (キンイロネクイハムシ)
Kami Kōdo, Kitsuregawa, 22-VII-1988, M. Inaizumi leg.
2. *Chrysolina virgata* (Motschulsky) (オオルリハムシ)
Kami Kōdo, Kitsuregawa, 20-VI-1988, M. Inaizumi leg.
3. *Cryptocephalus ohnoi* Kimoto (ムツキボシツツハムシ)
Jōmin Yūkari, Nasu, 29-VI-1999, M. Inaizumi leg.
4. *Ophraella communis* LeSage (ブタクサハムシ)
Mine-machi, Utsunomiya, 9-IX-1997, M. Inaizumi leg.
5. *Cassida sigillata* (Gorham) (イカリヒメジンガサハムシ)
Akiyama, Kuzuu, 29-IV-1998, M. Inaizumi leg.

Scale: 2mm

